

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas (guantes, overol, gorra, botas de caucho, mascarilla y gafas).
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- No comer, no beber, ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas biológicos, debe ser usado para almacenar agua o alimentos para consumo.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes ventilados, no exponer a la radiación solar.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Se debe evitar el contacto con los ojos y piel.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Si este producto fuera ingerido, beber abundante agua y llame al médico inmediatamente y muéstrele una copia de esta etiqueta.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa contaminada y lavar completamente las áreas afectadas con agua y jabón.
- Puede causar irritación dérmica y ocular.
- En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua fresca por lo menos durante 15 minutos, mientras se obtiene atención médica.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA: Llamar a SAMU: 106, ES SALUD: 107, Telef. del titular: +51(044)427-578

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- No contaminar fuentes de agua, lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos, restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos 10 metros.
- No aplicar en zonas de napas freáticas superficiales o con suelos altamente permeables.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en la zona tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
- No lave los equipos de aplicación en lagos, ríos, arroyos o estanques.



TRICHODERMA HARZIANUM

FUNGICIDA AGRICOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

COMPOSICIÓN:

- ▶ Trichoderma harzianum.....1x10⁹ UFC/ml
- ▶ Activador energético.....c.s.p 1L

Reg. N° XXX SENASA-PBA- EV



TITULAR DE REGISTRO:

SOLAGRI PERU S.A.C.
Av. Honorio Delgado Mz. Q' Lt. 8 Sub. 2
Semirústica El Bosque - Trujillo - La Libertad
Telf. 044-427578 // Cel: 955566663

FORMULADO Y DISTRIBUIDO POR:
SOLAGRI PERU S.A.C.

Lote N°:
Fecha de formulación:
Fecha de vencimiento:

Contenido Neto:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

TRH, es un fungicida biológico a base de *Trichoderma harzianum* el cual controla enfermedades causadas por hongos fitopatógenos regulando la enfermedad y deteniendo el daño, gracias a sus diferentes mecanismos de control. Entre estos, los principales son la competencia por espacio y nutrientes, el micoparasitismo y la antibiosis, los que tienen una acción directa frente al hongo fitopatógeno.

Método de aplicación: Se recomienda aplicar **TRH** vía aspección foliar y puede utilizarse en diferentes equipos de aplicación como: aspersora manual, aspersora a motor, nebulizadora, estación total, etc. Se recomienda calibrar los equipos antes de la aplicación para garantizar la total cobertura de la planta. Tome la dosis indicada de **TRH** y disuelva en suficiente agua para facilitar su incorporación.

El producto debe ser conservado en su envase original. Aplique la solución que contenga el producto el mismo día de su preparación.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cultivos	Plaga		Dosis L/200L	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Palto	Muerte regresiva	<i>Lasiodiplodia theobromae</i>	2.0	N.A.	N.A.

P.C: Periodo de Carenia LMR: Limite Máximo de Residuos en ppm NA: No Aplica

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar TR-HARZIANUM en cualquier etapa fenológica del cultivo si existe presencia de la plaga. La frecuencia dependerá de las recomendaciones del asesor técnico.

PERIODO DE REINGRESO

Se recomienda esperar hasta que el producto se haya secado sobre el cultivo antes de volver a ingresar al cultivo tratado.

COMPATIBILIDAD

No debe ser mezclado con productos de reacción alcalina. Siempre realice una prueba de compatibilidad antes de mezclarlo.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

