

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Utilice ropa protectora durante el manejo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas (guantes, overol, gorra, botas de caucho, mascarilla y gafas).
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- No comer, no beber, ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas biológicos, debe ser usado para almacenar agua o alimentos para consumo.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes ventilados, no exponer a la radiación solar.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Se debe evitar el contacto con los ojos y piel.

#### INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Si este producto fuera ingerido, beber abundante agua y llevar al médico inmediatamente y muéstrole una copia de esta etiqueta.
  - En caso de contacto con la piel, retirar la ropa contaminada y lavar completamente las áreas afectadas con agua y jabón.
  - Puede causar irritación dérmica y ocular.
  - En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua fresca por lo menos durante 15 minutos, mientras se obtiene atención médica.
- TELÉFONOS DE EMERGENCIA: Llamar a SAMU: 106, ES SALUD: 107, Telet. del titular: +51(0)41427-578

#### CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



#### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- No contaminar fuentes de agua, lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos resultantes de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos 10 metros.
- No aplicar en zonas de napas frías superficiales o con suelos altamente permeables.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestres. No permitir animales en la zona tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en sitios designados por las autoridades locales para este fin.
- No lave los equipos de aplicación en lagos, ríos, arroyos o estanques.



FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

#### COMPOSICIÓN:

- > Trichoderma harzianum.....1x10<sup>9</sup> UFC/ml
- > Activador energético.....c.s.p 1L

Reg. N° 0330-SENASA-PBA-ACBM



#### TITULAR DE REGISTRO:

SOLAGRI PERU S.A.C.  
Av. Honorio Delgado Mz. Q° Lt. 8 Sub. 2  
Seminaria El Bosque - Trujillo - La Libertad  
Tel: 044-427578 / Cel: 955566663  
FORMULADO Y DISTRIBUIDO POR:  
SOLAGRI PERU S.A.C.

Lote N°:  
Fecha de formulación:  
Fecha de vencimiento:

Contenido Neto:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

#### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

TRH, es un fungicida biológico a base de Trichoderma harzianum el cual controla enfermedades causadas por hongos fitopatógenos regulando la enfermedad y deteniendo el daño, gracias a sus diferentes mecanismos de control. Entre estos, los principales son la competencia por espacio y nutrientes, el micoparasitismo y la antibiosis, los que tienen una acción directa frente al hongo fitopatógeno.

Método de aplicación: Se recomienda aplicar TRH vía aspersión foliar y puede utilizarse en diferentes equipos de aplicación como: aspersora manual, aspersora a motor, nebulizadora, estaciontotal, etc. Se recomienda calibrar los equipos antes de la aplicación para garantizar la total cobertura de la planta. Tome la dosis indicada de TRH y disuelva en suficiente agua para facilitar su incorporación.

El producto debe ser conservado en su envase original. Aplique la solución que contenga el producto el mismo día de su preparación.

#### "CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

| Cultivos | Plaga            |                          | Dosis<br>L/200L | PC<br>(días) | LMR<br>(ppm) |
|----------|------------------|--------------------------|-----------------|--------------|--------------|
|          | Nombre común     | Nombre científico        |                 |              |              |
| Pallo    | Muerte regresiva | Lasiodiplodia theobromae | 2.0             | N.A.         | N.A.         |
| Acidiano | Muerte regresiva | Lasiodiplodia theobromae | 2.0             | N.A.         | N.A.         |
| Vid      | Moho gris        | Botrytis cinerea         | 2.0             | N.A.         | N.A.         |

PC: Período de Carenza LMR: Límite Máximo de Residuos en ppm N/A: No Aplica

#### FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplique TRH en cualquier etapa fenológica del cultivo si existe presencia de la plaga. La frecuencia dependerá de las recomendaciones del asesor técnico.

#### PERÍODO DE REINGRESO

Se recomienda esperar hasta que el producto se haya secado sobre el cultivo antes de volver a ingresar al cultivo tratado.

#### COMPATIBILIDAD

No debe ser mezclado con productos de reacción alcalina. Siempre realice una prueba de compatibilidad antes de mezclarlo.

#### FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico.

#### RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO

