

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

# CHEETARA

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

GRANULOS DISPERSABLES - WG

**Composición:**

Thiamethoxam .....250 g/Kg  
Aditivos ..... c.s.p.1 Kg

Reg. PQUA N° - SENASA

Titular del Registro:  
**SHARDA PERU S.A.C**  
Calle Las Castañitas 138  
Urb. El Palomar, San Isidro  
Teléfono: 222-2695

Importado y distribuido por:  
**TURO S.A.**  
Av. San Luis 2076, of. 103  
San Borja. Lima - Perú  
Teléfono: 650-6530

Formulado por:  
**SHARDA CROP CHEM LIMITED**  
Prime Business Park, Dashrathlhal  
Joshi Road, Vile Parle (W),  
Mumbai - 400 056 - INDIA  
Telf: (91) 22 6678 2800

Contenido Neto: 100 g

Lote N°:  
Fecha de Form.:  
Fecha de Venc.:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:**

- Este producto es ligeramente peligroso (cuidado), no ingerir.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado. No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Utilice el equipo de protección durante el mezclado, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimento o agua para consumo.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:**

- Grupo Químico: Neonicotinoide
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.
- En caso de ingestión, si el paciente está consciente y alerta, inducir al vómito. No administrar leche, alcohol o sustancias grasas.
- En caso de contacto con los ojos, mantener los ojos abiertos y enjuagar lentamente con abundante agua fría por 15 minutos.
- Remover los lentes de contacto si los hubiera y seguir enjuagándolos.
- En caso de contaminación dermal, quitar la ropa contaminada y los zapatos. Lavar el área afectada con jabón y grandes cantidades de agua mínimo 20 minutos.
- En caso de inhalación, retirar al paciente del área contaminada y trasladarlo a una zona ventilada. Si la persona no respira realizar respiración artificial.
- En caso de emergencia llamar a los siguientes teléfonos:

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA**

SAMU: 106  
SHARDA PERU SAC: 222-2695

**CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o depositela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:**

- Peligroso para organismos acuáticos.
- Tóxico para abejas u otros artrópodos benéficos. Evitar la aplicación en época de floración.

- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos cinco metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelo altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

**CHEETARA** es un insecticida que tiene actividad sistémica y actúa sobre el sistema nervioso central de los insectos. **CHEETARA** se usa en aspersión foliar para lo cual se debe agregar la cantidad de producto a usar al volumen total de agua que se usará en la aplicación.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:**

- El momento para realizar la aplicación estará determinado por la evaluación del campo en la que se determine que hay riesgo de daño económico al cultivo.
- Se recomienda realizar como máximo 01 aplicación por campaña por año.

**PERIODO DE REINGRESO:**

No ingrese a las áreas tratadas durante 24 horas después de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD:**

No se reconoce incompatibilidad con otros plaguicidas.

**FITOTOXICIDAD:**

No es fitotóxico a la dosis y uso recomendados.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones en instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico	g/200L	g/ha		
Tomate	Mosquilla de los brotes	<i>Prodiplosis longifila</i>	75	225	7	0.2
Vid	Piojo Harinoso	<i>Planococcus citri</i>	80	-	21	0.5
Palto	Mosca blanca	<i>Aleurodicus juleikae</i>	75	-	3	0.5
Pimiento	Mosca blanca	<i>Bemisia tabaci</i>	70	-	3	0.7
Arroz	Cigarrita del virus de la hoja blanca	<i>Sogatodes orizicolus</i>	70 - 100	-	21	0.02

P.C.: Período de carencia

L.M.R.: Límite máximo de residuos

