

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

Kryptón[®]
50 WG
PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA
INSECTICIDA AGRÍCOLA
GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)

COMPOSICIÓN:
Emamectin benzoato 50 g/kg
Aditivos c.s.p. 1 kg

Reg. PQUA N° 1138 - SENASA

Titular del Registro: FARMEX S.A.
Formulado por:
SHANGHAI E-TONG CHEMICAL CO., LTD
N° 23, Lane 5398, Shenzhuan Road
Song Jiang District, Shanghai
CHINA
Importado y distribuido por:



Calle Dean Valdivia N° 148 Piso 7
San Isidro, Lima 27 - PERU
Teléfono: (01) 630-6400.
www.farmex.com.pe

CONTENIDO NETO: 100 g

N° de lote:
Fecha de formulación:
Fecha de vencimiento:

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

© Marca registrada de Farmex S.A.

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN
- Este producto es de CUIDADO, no ingerir. - Peligroso si es inhalado, evite respirar polvo o aspersión. - No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. - Después de usar el producto lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón. - Utilice el equipo de protección durante las operaciones de mezcla y aplicación (guantes de goma, delantal, botas de goma, gafas, careta, gorro, máscara contra el polvo, respirador u otros) y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas. - Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS
- Grupo químico: Avermectina
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrelle la etiqueta y la hoja informativa adjunta.
- En caso de ingestión, no provoque el vómito en la persona, a menos que así lo indique un profesional de la salud. - En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca por lo menos durante 15 minutos. - Nota al médico: No tiene antídoto específico, el tratamiento es sintomático. - **TELÉFONOS DE EMERGENCIA: SAMU: 106, FARMEX S.A.: (01) 630-6400, CISPROQUIM: 080-050-847.**
CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS
Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o depositela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE
- Tóxico para abejas y artrópodos benéficos. - No aplicar en época de floración. - Tóxico para organismos acuáticos. - No contaminar lagos, ríos, estanques o acequias con los desechos y envases vacíos. - Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros. - Peligroso para los animales domésticos, la fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada. - El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva. - En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.
INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO: KRYPTON® 50 WG es un insecticida de la familia de las avermectinas con actividad traslaminar utilizado para el control de larvas de lepidópteros y otros minadores de hojas. **KRYPTON® 50 WG** actúa principalmente por ingestión y contacto directo, además tiene acción ovo-larvicia. **KRYPTON® 50 WG** se prepara haciendo una pre-mezcla de la dosis recomendada en 1/3 del volumen de agua, se agita bien y luego se completa con agua hasta obtener el volumen deseado.

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	g/cil	g/ha		
ALCACHOFA	Gusano cogollero	Spodoptera frugiperda	100	200	3	0.05
ARÁNDANO	Perforador de frutos	Chloridea virescens	100	--	21	0.002
ARROZ	Gusano cogollero	Spodoptera frugiperda	--	100	30	0.01
ESPÁRRAGO	Gusano cogollero	Spodoptera frugiperda	--	200	30	0.01
PIMIENTO	Gusano perforador de bellota	Heliothis virescens	--	200	7	0.02

PC: Período de carencia en días. **LMR:** Límite máximo de residuos en partes por millón.
FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: En el cultivo de arroz se recomienda un máximo de 1 aplicación/campaña y considerando hasta 2 campañas/año. Y en los cultivos de alcachofa, arándano, espárrago y pimiento se recomienda un máximo de 2 aplicaciones/campaña con un intervalo mínimo de 14 días y considerando una sola campaña/año. En todos los cultivos la época o momento de aplicación es a la aparición de las primeras larvas, cuando se tenga un 5% de plantas infestadas en campo.
PERÍODO DE REINGRESO: Se recomienda no reingresar al campo tratado antes de transcurrido 24 horas del tratamiento.
COMPATIBILIDAD: KRYPTON® 50 WG es compatible con la mayoría de agroquímicos de uso común. No mezclar con aquellos de reacción alcalina, ácida u oxidante fuerte. Para mayor seguridad realizar pruebas previas de compatibilidad antes.
FITOTOXICIDAD: El producto no es fitotóxico cuando es utilizado según se recomienda en la etiqueta. La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de uso.
RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

