

1,0 ± 0,3

1,0 ± 0,3

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Tóxico por ingestión: Letal si es ingerido.
- Moderadamente peligroso si es inhalado. Evitar respirar vapor o aspersion.
- No comer, no beber, ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Utilizar equipo de protección durante el manipuleo, mezcla y aplicación y para ingresar al área tratada dentro de las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto, cambiarse de ropa, bañarse con abundante agua y jabón y, lavar la ropa contaminada.
- Guardar este producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar junto con alimentos, bebidas, medicinas, ni forrajes.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- No re-ensavar o depositar el contenido en otros envases.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- **Grupo químico: Lambda-cyhalothrin (Piretroide)/ Thiamethoxam (Neonicotinoide)**
- En caso de intoxicación por ingestión llevar al paciente inmediatamente al médico y mostrarle la etiqueta.
- No administrar nada a una persona inconsciente, obtener ayuda médica de inmediato.
- En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua por 15 minutos y llevar al paciente al médico.
- En caso de contacto con la piel, quitarse la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón por 20 minutos.
- En caso de intoxicación por inhalación, llevar a la persona a un lugar abierto y proporcionarle aire fresco, despejar las ropas alrededor del cuello y el pecho. Brindar respiración artificial y llevar al paciente al médico.
- No existe antídoto específico. El tratamiento será sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
SAMU: 106 SICSAC: (01) 644-9297

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Tóxico para las abejas u otros artrópodos benéficos, no aplicar en época de floración.
- Muy tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- Evitar que el producto se aplique en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.

MILITAR® 247SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Composición:

Lambda-cyhalothrin..... 107 g/L
 Thiamethoxam..... 142.1 g/L
 Aditivos..... c.s.p. 1 L

Reg. PQUA N° 2597 - SENASA

Titular del Registro, Importador y Distribuidor:



SILVESTRE INTERNATIONAL COMPANY S.A.C.

Av. Javier Prado Este N°6210 - Oficina N° 306
La Molina. Lima - Perú. Telf.: (01) 644-9297

Contenido Neto: 100 L

N° de Lote:

F. de Form.:

F. de Venc.:

Formulado por:

JIXI AGROSINO BIOTECH CO. LTD.

No. 7 Huanyang East Road,

Jixi County Anhui Province. China.

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO

**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

MILITAR® 247 SC está compuesto por lambda-cyhalothrin, un insecticida piretroide de contacto e ingestión y de amplio espectro y thiamethoxam, un insecticida neonicotenoide altamente sistémico y de amplio espectro. Presenta un buen efecto residual sobre insectos del suelo y follaje. En pimiento se recomienda la aplicación foliar y en brotes.

MILITAR® 247 SC se emplea diluido en agua; preparar una pre-mezcla de acuerdo a la dosis recomendada, en un tercio del volumen de agua a utilizar. Agitar bien y completar el volumen de agua de aplicación.

MILITAR® 247 SC puede ser aplicado con cualquier equipo convencional terrestre (mochilas a palanca o motor, parihuelas, etc.). Antes de iniciar la aplicación, asegurarse que el equipo se encuentre en perfecto estado de funcionamiento y correctamente calibrado.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	L/200L	L/ha		
ESPÁRRAGO	Chinche	<i>Euschistus convergens</i>	0.15-0.25	-	21	0.02(1) 0.05(2)
MAIZ	Chinche del maiz	<i>Sthenaridea carmelitana</i>	0.15-0.20	-	21	0.02(1) 0.05(2)
MANDARINA	Queresa coma	<i>Lepidosaphes beckii</i>	0.1-0.125	-	28	0.2(1) 0.5(2)
PALTO	Queresa	<i>Florinia florinae</i>	0.1-0.125	-	14	0.2(1) 0.5(2)
PAPA	Gorgojo de los andes	<i>Premnotrypes suturicallus</i>	0.25-0.30	-	21	0.01(1) 0.3(2)
PIMIENTO	Mosquilla de los brotes	<i>Prodiplosis longifila</i>	0.125	0.145	5	0.2(1) 0.1(2)
VID	Cochinilla harinosa	<i>Planococcus ficus</i>	0.15	-	21	0.08(1) 0.5(2)

P.C.: Periodo de Carenacia

(1) Lambda-cyhalothrin
(2) Thiamethoxam

L.M.R.: Límite Máximo de Residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Se recomienda realizar un máximo de 1 aplicación por campaña/año para el cultivo de espárrago, pimiento, vid y mandarina. Para papa realizar 1 aplicación por campaña, considerando 1 campaña al año, dosis máxima de 0.375 L/Ha (gasto de agua 250 L/Ha). Para palto realizar como máximo 1 aplicación por campaña, considerando 1 campaña al año (gasto de agua máximo de 600 L/Ha). En maíz se recomienda realizar como máximo 1 aplicación por campaña, considerando 1 campaña al año, cantidad máxima de aplicación por hectárea: 0.35 L/Ha. Para el momento de aplicación se deberá evaluar la incidencia de la plaga y las condiciones óptimas de su desarrollo para proceder a la aplicación de **MILITAR® 247 SC**. También dependerá de la etapa de desarrollo del cultivo y la época de siembra. Usar la menor dosis en baja incidencia y la mayor dosis a mayor incidencia de la plaga. No aplicar en época de floración.

PERIODO DE REINGRESO: Se puede reingresar al campo con equipo de protección durante las primeras 24 horas de aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD: El producto es compatible con la mayoría de los insecticidas, fungicidas y abonos foliares utilizados convencionalmente en los cultivos recomendados. Antes de efectuar las mezclas, se recomienda hacer pruebas de compatibilidad con el plaguicida que se desea aplicar.

FITOTOXICIDAD: La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.



14,5 ± 0,3

2,2

Medidas en cm.

Envase PEAD