

10 k

MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

BASTNATE XTRA

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRICOLA

HERBICIDA AGRICOLA

GRANULOS SOLUBLES (SG)

Composición

Glufosinate-ammonium 800 g/kg

Aditivos c.s.p. 1kg

TITULAR DEL REGISTRO:

RAINBOW AGROSCIENCES S.A.C

Av. Alfredo Benavides N° 2150, Int. 701
Urb. El Rosedal, Miraflores, Lima - Perú.
Teléfono: (511) 678-9544



FORMULADOR:

SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO. LTD.

Binhai Economic Development Area Weifang,
Shandong 262737, China.
Teléfono: 86-531-88875230 / 88875231
E-mail: rainbowagro@rainbowagro.com
<https://www.rainbowagro.com/>

IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR:

SOLANDINA PERU S.A.C.

Av. Alfredo Benavides N° 2150, Int. 701
Urb. El Rosedal, Miraflores, Lima - Perú.
Teléfono: +51 992 763 127

Contenido neto: 10K

N° de Lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de vencimiento:

Nocivo en caso de ingestión
Nocivo en contacto con la piel
Nocivo si se inhala

Tóxico para
organismos acuáticos



ATENCIÓN

**"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Causa irritación moderada a los ojos.
- Cuidado, evite el contacto, posible teratogénico
- Este producto es de CUIDADO, no ingerir.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación del producto.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Utilizar equipo de protección personal durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada dentro de las primeras 12 horas después de la aplicación

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Organophosphate
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No le dé nada por la boca a una persona inconsciente. Llevar al afectado al médico inmediatamente.
- En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua y jabón durante 15 - 20 minutos y lavar la ropa contaminada.
- En caso de contacto con los ojos, lavar con agua corriente durante 15 - 20 minutos.
- En caso de inhalación: Trasladar al afectado a un ambiente fresco con buena ventilación. En caso de haber dificultad en la respiración, dar oxígeno. Llevar al médico.
- GRUPO HRAC:10

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

SAMU: 106
RAINBOW AGROSCIENCIAS: 01- 678-9544

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o dépositela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar las fuentes de agua como ríos, estanques o arroyos con los sobrantes del producto, envases vacíos o restos de aplicación.
- Respetar una banda de no aplicación hacia los cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas para controlar la deriva.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

BASTNATE XTRA es un herbicida no selectivo, de contacto y con poca acción sistémica. Actúa como inhibidor de la sintetasa de glutamina: acumula iones de amonio, inhibe la fotosíntesis. Calcular la cantidad de agua a emplear de acuerdo a la superficie a asperjar. Agregar en el tanque de mezcla la mitad del agua a usar, luego agregar **BASTNATE XTRA** en la dosis recomendada, agitar y finalmente adicionar el resto de agua.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO

Cultivo	Plaga		Dosis (Kg/ha)	PC (días)	LMR (ppm)
	N. Común	N. científico			
Mandarina	Coquito Pega pega	<i>Cyperus rotundus</i> <i>Setaria verticillata</i>	0.2 - 0.4	1	0.05
Palto	Coquito Verdolaga	<i>Cyperus rotundus</i> <i>Portulaca oleracea</i>	0.2 - 0.4	1	0.1
Uva	Coquito Verdolaga	<i>Cyperus rotundus</i> <i>Portulaca oleracea</i>	0.2 - 0.4	7	0.15

PC: Periodo de carencia LMR: Límite máximo de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

- La aplicación debe dirigirse a la maleza en pleno crecimiento vegetativo y cuando tenga entre 2 a 6 hojas verdaderas o no exceda los 20 cm de tamaño.
- Aplicar en las primeras horas de la mañana y cuando no se tenga vientos superiores a 10 km/hora. Se recomienda el uso de campana para evitar deriva a las hojas del cultivo, debido a que **BASTNATE XTRA** no es selectivo y podría ocasionar problemas de fitotoxicidad si entra en contacto con el follaje del cultivo
- Como máximo una aplicación por campaña/año.

PERIODO DE REINGRESO

No ingrese al área tratada hasta después de 24 horas de realizada la aplicación

COMPATIBILIDAD

Incompatible con ácidos fuertes, bases fuertes y oxidantes.

FITOTOXICIDAD

La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

Categoría toxicológica 4: LIGERAMENTE PELIGROSO

