

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA, ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO
“MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

- PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACION**
- Utilice ropa de protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas.
 - No comer, no beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
 - Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
 - Conserve el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
 - No almacenar ni transportar juntamente con alimentos, bebidas, medicinas, ni forrajes.
 - No utilizar el envase vacío para almacenar bebidas ni alimentos.
 - Usar overol, botas, guantes resistentes a químicos, mascarilla, protector de ojos y rostro contra salpicaduras.

- INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**
- En caso de intoxicación llamar inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
 - En caso de ingestión, buscar inmediatamente atención médica. Mantenerlo en reposo. NUNCA provocar el vómito.
 - En caso de contacto con los ojos, llevar lentes de contacto, quitarlos. Enjuagar inmediatamente con abundante agua limpia y fresca, por lo menos durante 10 minutos tirando hacia arriba los párpados . buscar asistencia medica.
 - En caso de contacto con la piel, quitar la ropa contaminada y lavar la piel con jabón y abundante agua. NUNCA utilizar disolventes o diluyentes. Si la irritación persiste, llame al médico.
 - En caso de inhalación, trasladar al afectado al aire libre, mantenerlo caliente y en reposo, si la respiración es irregular o se detiene practicar respiración artificial. no administrar nada por la boca si esta inconsciente, ponerlo en posición adecuada y buscar ayuda medica.
 - Notal al medico: no tiene antídoto específico, tratamiento sintomático.

TELEFONOS DE EMERGENCIA
SAMU: 106
AGRILAB PERU S.R.L.: 01-653-2290

- CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
 - Después de usar el contenido, enjuague tres veces éste envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilicelo triturandolo o perforandolo.
 - Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
 - Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
 - Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



- MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**
- No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.
 - Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, del al menos 10 metros.
 - No aplicar en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeable.
 - No permitir animales en el área tratada.
 - El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
 - En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

VEGEX KUNEKA

EXTRACTO VEGETAL

INSECTICIDA - ACARICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

Composición:
Extracto de Neem..... 14.20 g/L
Extracto de Karanja oil 393.8 g/L
Aditivos c.s.p. 1 L

Registro PBUA N° - SENASA

Titular de Registro: AGRILAB PERU S.R.L.
Dirección: Jr. Sáenz Peña N° 344, Dpto. 105, Magdalena del Mar, Lima - Perú.
Telf: 01 653-2290

Formulado por: IDAI NATURE S.L.
Dirección: Calle Moscú, 10 - Pol. Indu. Mas de Tous - 46185, La Pobra de Vallbona, Valencia - España
Telf: +34 961 661 414

Contenido: **20 L**

Lote N°:
F. de Form.:
F. de venc.:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
VEGEX KUNEKA, es un plaguicida que actúa por contacto e ingestión, contiene extracto de neem y extracto de karanja oil. Actua inhibiendo la alimentación y el crecimiento, al comportarse como un regulador de crecimiento de insectos (IGR); se indica que también tiene efecto repelente.

VEGEX KUNEKA se aplica con equipos convencionales de aplicación y agua a pH 5,5 o en su defecto, entre 5 y 6. Para la preparación de la mezcla, llene el cilindro o tanque de aplicación con agua limpia hasta la mitad y añada el plaguicida a la dosis recomendada revolviendo constantemente. Completar hasta el volumen deseado.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”					
CULTIVOS	PLAGA		Dosis (L/200L)	P.C. (Días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Mandarina	Araña roja de los citrus	<i>Panonychus citri</i>	1.0	N.A.	N.A.
Palto	Trips del palto	<i>Heliothrips haemorrhoidalis</i>	0.6-0.8	N.A.	N.A.
Vid	Araña roja	<i>Tetranychus urticae</i>	0.8	N.A.	N.A.

LMR: Límite Máximo de Residuos **PC.:** Periodo de Carenia.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN
- Aplicar previa evaluación de la plaga; el numero de aplicaciones depende de la intensidad del ataque de la plaga, con un intervalo entre 5 a 10 días.
- Aplicar con una buena cobertura, llegando al interior de las plantas.

PERIODO DE REINGRESO:
No reingresar al campo, hasta después de 12 horas de haber aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD:
No presenta problema de mezclas con otros productos. Para asegurarse que no hay problemas realizar pruebas previas de compatibilidad si se mezcla con otros productos.

FITOTOXICIDAD:
No es fitotóxico usado a la dosis y cultivo recomendado en la presente etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:
El titular de registro garantiza que las características fisico-químicas del producto contenido en éste envase correspondan a la anotada en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si se requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.



**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

