

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. - Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado. -No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes. - Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón. - Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación, y para ingresar al área tratada. - El producto es irritante para los ojos, la piel o el aparato respiratorio. - El producto es nocivo por ingestión, contacto con la piel o por inhalación. - No reenvasar o depositar el contenido en otros envases. - Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento. - No utilizar el producto en ambientes cerrados como invernaderos, almacenes, etc. - Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reusarse.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Avermectinas. - En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta. - En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón. - No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente. - No existe antídoto específico. - El médico deberá instituir tratamiento sintomático. - En caso de emergencia llamar a:

ARIS INDUSTRIAL S.A.: (01) 336-5428, SAMU: 106

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de la aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin. - Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase. - Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Muy peligroso para las abejas. Nocivo para la fauna benéfica. - No aplicar en época de floración. - Peligroso para los peces, no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos. Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto. En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin. - Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.



PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE – EC

COMPOSICIÓN:

Abamectin.....18 g/L

Aditivos c.s.p. 1L

Registro PQUA N° 059 – SENASA
Titular de Registro: ARIS INDUSTRIAL S.A.

ARIS

FORMULADO Y DISTRIBUIDO POR:
ARIS INDUSTRIAL S.A.
Av. Industrial 491, Lima - Perú.
Telf.: (01) 336 5428

Fecha de Formulación:
Lote N°:
Contenido Neto: 250 ml
Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO



INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

ABAFIN 1.8 EC es un insecticida-acaricida sistémico de amplio espectro y de actividad translaminar para el control de diversas plagas agrícolas.

- Aplicar **ABAFIN 1.8 EC** con los equipos de aplicación convencional.
- Realizar una pre-mezcla de seguridad y utilizar un volumen de agua que logre el cubrimiento total del cultivo.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGAS		Dosis (ml/200L)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Científico	Nombre Común			
Aji	<i>Polyphagotarsonemus latus</i>	Ácaro hialino	100-150	7	0.01
Mandarina	<i>Phyllocnistis citrella</i>	Minador de cítricos	100-125	7	0.01
	<i>Panonychus citri</i>	Araña roja	150-250	10	0.01
Palto	<i>Oligonychus punicae</i>	Araña roja	150	14	0.01
Pimiento	<i>Polyphagotarsonemus latus</i>	Ácaro hialino	150	7	0.02
Alcachofa	<i>Nemorimyza maculosa</i>	Mosca minadora	300	9	0.01
Holantao	<i>Liniomyza huidobrensis</i>	Mosca minadora	250	3	0.01
Vid	<i>Tetranychus urticae</i>	Araña roja	200	28	0.01
Papa	<i>Polyphagotarsonemus latus</i>	Ácaro hialino	100	14	0.01

PC: Período de Carencia en días. LMR: Límite Máximo de Residuos expresados en ppm.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Para los cultivos de alcachofa y holantao se recomiendan máximo 3 aplicaciones por campaña. Para los cultivos de palto, vid y papa se recomienda máximo 2 aplicaciones por campaña. Para los cultivos de ají, mandarina y pimiento se recomienda máximo 1 aplicación por campaña.

PERIODO DE REINGRESO: No entre en las áreas tratadas después de 24 horas de aplicación.

COMPATIBILIDAD: **ABAFIN 1.8 EC** es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, exceptuado los de marcada reacción alcalina. Siempre se recomienda hacer una pre-mezcla.

FITOTOXICIDAD: **ABAFIN 1.8 EC** no es fitotóxico a las dosis y usos recomendados en esta etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

