

20.00 cm

20.00 cm

ZONA DE TROQUELADO

ZONA DE TROQUELADO

Cipermax[®]
SUPER 10 CE

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

COMPOSICIÓN:
Alpha-cypermethrin.....100 g/L
Aditivos.....c.s.p..... 1 L

Reg. PQUA N° XXXX-SENASA

Titular del Registro: FARMEX S.A.

Formulado y distribuido por:



Calle Dean Valdivia N° 148 Piso 7
San Isidro, Lima 27 - PERÚ
Teléfono: (01) 630-6400
www.farmex.com.pe

CONTENIDO NETO: 20 L

N° de Lote:

Fecha de formulación:

Fecha de vencimiento:

NO CORROSIVO

© Marca registrada de FARMEX S.A.



INFLAMABLE



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

NO EXPLOSIVO

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGANSE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es DANINO, no ingerir. - Cuidado, evite el contacto. - Cuidado, evite el contacto, posible teratogénico. - Peligroso si es inhalado. Evite respirar (aspersión). - Causa irritación moderada a los ojos. - Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado. - Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado. - No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. - Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación. - Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón. - No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes. - Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo. - Mantener el producto en el envase original, etiquetado y cerrado. - Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Piretroide. - En caso de intoxicación: Llevar al paciente inmediatamente a un centro médico cercano, tener la etiqueta del producto a la mano. - En caso de inhalación: Retirar a la persona a un lugar con aire fresco, dar respiración artificial de ser necesario. - En caso de contacto con la piel: Retirar la ropa y calzado inmediatamente, bañarse con abundante agua y jabón. Lavar la ropa. - En caso de contacto con los ojos: Enjuagar inmediatamente con abundante agua durante 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. Retirar lentes de contacto si los hubiera. - En caso de ingestión: Enjuagar la boca con abundante agua, no inducir al vómito. Llamar a un médico o llevar al paciente a un centro hospitalario. - Indicaciones: Tratamiento sintomático y de soporte. No existe un antídoto específico.

Teléfonos de emergencia: SAMU: 106, CISPROQUIM: 080-050-847, Teléfono del titular: FARMEX S.A.: (01) 630-6400.

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión. - Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado. - Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para abejas. - Nocivo para la fauna benéfica. - No aplicar en época de floración. - No aplicar en presencia de polinizadores. - No aplicar si se verifica la presencia de abejas y/o artrópodos benéficos en el cultivo a tratar o cultivos aledaños. - Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas. - No aplicar cerca de las colmenas de las abejas, proteger los colmenares antes de la aplicación del producto. - Aplicar sólo a primeras horas de la mañana o al atardecer cuando las abejas no estén polinizando. - Evitar que la aplicación esté dirigida a otro tipo de vegetación en floración que atraen polinizadores. - Aplicar temprano en las mañanas o por las tardes. Evitar la deriva por el viento. - Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas. - Peligroso para organismos acuáticos. - No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos. - No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto. - Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos cinco (05) metros. - Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada. - El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables. - En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

CIPERMEX SUPER 10 CE[®] es un insecticida sintético de la familia de los piretroides. Actúa por contacto y/o ingestión afectando al sistema nervioso central y periférico de insectos masticadores y picadores chupadores. Para la aplicación se recomienda primero diluir la dosis a emplear en la tercera parte del volumen del cilindro, mochila de aplicación o tanque de aplicación, remover bien y luego completar el volumen total con agua. Si aplica corrector de pH realizarlo antes de aplicar la dosis.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	L/ha	mL/cil		
Alcachofa	Gusano perforador de capítulos	<i>Chloridea (=Heliothis) virescens</i>	-	200 - 250	3	0,1
Alfalfa	Caballada (gusano ejército)	<i>Spodoptera eridania</i>	0,25 - 0,3	-	14	30
Algodón	Gusano rosado de la India	<i>Pectinophora gossypiella</i>	0,25 - 0,3	-	14	0,5
	Arrebiatado	<i>Dysdercus peruvianus</i>	0,2 - 0,3	-	14	0,5
<i>Capsicum annuum</i> (pimiento, paprika, piquillo)	Polilla (gusano del fruto)	<i>Symmetrischema capsicum</i>	-	300	5	0,1
Camote	Caballada (gusano ejército)	<i>Spodoptera eridania</i>	-	300 - 400	7	0,01
Cebolla	Trips	<i>Thrips tabaci</i>	-	300	7	0,01
Espárrago	Gusano comedor de hoja	<i>Chloridea (=Heliothis) virescens</i>	-	250	7	0,4
Maíz	Gusano cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	-	250	21	0,05
Papa	Mosca minadora (adultos)	<i>Liriomyza huidobrensis</i>	0,4 - 0,5	-	14	0,01
Tomate	Oruga minadora de hoja y tallo	<i>Tuta (=Scrobipalpula) absoluta</i>	0,4 - 0,6	-	5	0,2

PC: Período de carencia en días. LMR: Límite máximo de residuos expresados en partes por millón (ppm).

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Para todos los cultivos recomendados el número de aplicaciones no debe superar las 2 aplicaciones por campaña, con un intervalo de 14 días o más, dependiendo del nivel de reinstestación. No aplicar en época de floración.

PERÍODO DE REINGRESO: No reingresar sin protección a un campo aplicado hasta 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: CIPERMEX SUPER 10 CE[®] es compatible con la mayoría de productos fitosanitarios de uso común, a excepción de aquellos de reacción alcalina y agentes fuertemente oxidantes.

Antes de hacer mezcla con otros plaguicidas se debe corregir el pH del agua y probar la compatibilidad entre los productos mezclándolos en su debida proporción en un envase pequeño.

FITOTOXICIDAD: La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos podría ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

