

64.00 cm

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”  
“MANTÉNGANSE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Este producto es DAÑINO, no ingerir. - Cuidado, evite el contacto. - Cuidado, evite el contacto, posible teratogénico. - Peligroso si es inhalado. Evite respirar (aspersión). - Causa irritación moderada a los ojos. - Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado. - Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado. - No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. - Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación. - Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón. - No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes. - Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo. - Mantener el producto en el envase original, etiquetado y cerrado. - Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo químico: Piretroide. - En caso de intoxicación: Llevar al paciente inmediatamente a un centro médico cercano, tener la etiqueta del producto a la mano. - En caso de inhalación: Retirar a la persona a un lugar con aire fresco, dar respiración artificial de ser necesario. - En caso de contacto con la piel: Retirar la ropa y calzado inmediatamente, bañarse con abundante agua y jabón. - En caso de contacto con los ojos: Enjuagar inmediatamente con abundante agua durante 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. Retirar lentes de contacto si los hubiera. - En caso de ingestión: Enjuagar la boca con abundante agua, no inducir al vómito. Llamar a un médico o llevar al paciente a un centro hospitalario. - Indicaciones: Tratamiento sintomático y de soporte. No existe un antídoto específico. **Teléfonos de emergencia: SAMU: 106, CISPROQUIM: 080-050-847, Teléfono del titular: FARMEX S.A.: (01) 630-6400.**

**CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión. - Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado. - Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**

- Peligroso para abejas. - Nocivo para la fauna benéfica. - No aplicar en época de floración. - No aplicar en presencia de polinizadores. - No aplicar si se verifica la presencia de abejas y/o artrópodos benéficos en el cultivo a tratar o cultivos aledaños. - Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas. - No aplicar cerca de las colmenas de las abejas, proteger los colmenares antes de la aplicación del producto. - Aplicar sólo a primeras horas de la mañana o al atardecer cuando las abejas no estén polinizando. - Evitar que la aplicación esté dirigida a otro tipo de vegetación en floración que atraen polinizadores. - Aplicar temprano en las mañanas o por las tardes. Evitar la deriva por el viento. - Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas. - Peligroso para organismos acuáticos. - No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos. - No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto. - Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos cinco (05) metros. - Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada. - El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables. - En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.



# Cipermax<sup>®</sup>

## SUPER 10 CE

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**INSECTIDA AGRÍCOLA**

**CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)**

**COMPOSICIÓN:**

Alpha-cypermethrin.....100 g/L  
Aditivos.....C.S.p..... 1 L

Titular del Registro: FARMEX S.A.

Reg. PQUA N° XXXX-SENASA

CONTENIDO NETO: 200 L

Formulado y distribuido por:



Calle Dean Valdivia N° 148 Piso 7  
San Isidro, Lima 27 - PERÚ  
Teléfono: (01) 630-6400  
www.farmex.com.pe

**NO CORROSIVO**

**INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**

© Marca registrada de FARMEX S.A.

**MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

CIPERMEX SUPER 10 CE<sup>®</sup> es un insecticida sintético de la familia de los piretroides. Actúa por contacto y/o ingestión afectando al sistema nervioso central y periférico de insectos masticadores y picadores chupadores. Para la aplicación se recomienda primero diluir la dosis a emplear en la tercera parte del volumen del cilindro, mochila de aplicación o tanque de aplicación, remover bien y luego completar el volumen total con agua. Si aplica corrector de pH realizarlo antes de aplicar la dosis.

**“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”**

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	L/ha	mL/cil		
Alcachofa	Gusano perforador de capítulos	<i>Chloridea (=Heliothis) virescens</i>	-	200 - 250	3	0,1
Alfalfa	Caballada (gusano ejército)	<i>Spodoptera eridania</i>	0,25 - 0,3	-	14	30
Algodón	Gusano rosado de la India	<i>Pectinophora gossypiella</i>	0,25 - 0,3	-	14	0,5
	Arrebiatado	<i>Dysdercus peruvianus</i>	0,2 - 0,3	-	14	0,5
<i>Capsicum annuum</i> (pimiento, páprika, piñuelo)	Polilla (gusano del fruto)	<i>Symmetrischema capsicum</i>	-	300	5	0,1
Camote	Caballada (gusano ejército)	<i>Spodoptera eridania</i>	-	300 - 400	7	0,01
Cebolla	Trips	<i>Thrips tabaci</i>	-	300	7	0,01
Espárrago	Gusano comedor de hoja	<i>Chloridea (=Heliothis) virescens</i>	-	250	7	0,4
Maíz	Gusano cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	-	250	21	0,05
Papa	Mosca minadora (adultos)	<i>Liriomyza huidobrensis</i>	0,4 - 0,5	-	14	0,01
Tomate	Oruga minadora de hoja y tallo	<i>Tuta (=Scrobipalpa) absoluta</i>	0,4 - 0,6	-	5	0,2

PC: Período de carencia en días. LMR: Límite máximo de residuos expresados en partes por millón (ppm).

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:** Para todos los cultivos recomendados el número de aplicaciones no debe superar las 2 aplicaciones por campaña, con un intervalo de 14 días o más, dependiendo del nivel de reinfestación. No aplicar en época de floración.

**PERÍODO DE REINGRESO:** No reingresar sin protección a un campo aplicado hasta 24 horas después de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD:** CIPERMEX SUPER 10 CE<sup>®</sup> es compatible con la mayoría de productos fitosanitarios de uso común, a excepción de aquellos de reacción alcalina y agentes fuertemente oxidantes.

Antes de hacer mezcla con otros plaguicidas se debe corregir el pH del agua y probar la compatibilidad entre los productos mezclándolos en su debida proporción en un envase pequeño.

**FITOTOXICIDAD:** La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos podría ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



Version 2  
2.48 cm

16.50 cm

ZONA DE TROQUELADO