

“LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Ligeramente irritante ocular.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Almacenar en lugares frescos y sombreados, que no superen los 30 °C.
- Almacenar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado alejado de alimentos y medicinas para uso humano y veterinario.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y lávese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante la manipulación y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS.

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de contacto con la piel, enjuagar el área con abundante agua fresca y lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca.
- En caso de ingestión, se recomienda inducir al vómito y consultar al médico.
- Antídoto: No posee antídoto. Tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
SAMU 106 - INFOSALUD: 113
BITEC AGRO Telf.: 923535562

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.
- No aplicar en zonas con napas freáticas superficiales o con suelos altamente permeables.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

VITAL

AGENTE DE CONTROL BIOLÓGICO MICROBIANO

FUNGICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

COMPOSICIÓN:

Trichoderma asperellum.....2.1 x 10⁹ UFC/ml (20%)
Aditivos.....c.s.p 1L (80%)

Registro N° - SENASA

Titular de Registro

BITEC AGRO

Sector Longar (Predio la Huaca con U.C. No. 42259)
San Juan Bautista - Ica - PERÚ
Telf.: 923535562

Formulador:

BITEC AGRO

Sector Longar (Predio la Huaca con U.C. No. 42259)
San Juan Bautista - Ica - PERÚ
Telf.: 923535562

Importador y Distribuidor:

BITEC AGRO

Sector Longar (Predio la Huaca con U.C. No. 42259)
San Juan Bautista - Ica - PERÚ
Telf.: 923535562



Fecha de Formulación:

N° de Lote:

Contenido Neto: **1 LITRO**

Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

VITAL es un fungicida biológico, producido a base de *Trichoderma asperellum*, es un hongo con propiedades antagonistas, como la competencia, micoparasitismo y antibiosis, las cuales actúan en contra de los hongos fitopatógenos.

Para la preparación de la mezcla es necesario regular el pH del agua en un rango de 5.5 a 6.5, ya que no trabaja con pH alcalino. Llenar el recipiente de la mezcla hasta la mitad con agua, agregar la cantidad de producto que se va a utilizar, agitar y mezclar homogéneamente (se recomienda utilizar un dispersante y adherente químico, para mejores resultados) completar con agua hasta llenar el tanque. En la aplicación de **VITAL** en el campo, se recomienda aplicarlo en el haz y envés de las hojas.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGA		DOSIS L/ha	P.C. (días)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO		
Arándano	“Alternaria”	<i>Alternaria alternata</i>	1	N.A.

P.C.: Periodo de Carencia

N.A.: No aplica

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se recomienda realizar 01 aplicación de **VITAL** por campaña, considerando 01 campaña al año.

PERIODO DE REINGRESO

No entre a las áreas tratadas durante las 04 primeras horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

VITAL es compatible con insecticidas, bioinsumos, fertilizantes foliares, promotores de crecimiento vegetal y algunos fungicidas y bactericidas. Antes de usarlo en mezcla se debe hacer una prueba de compatibilidad. No mezclar con aguas duras ni alcalinas. No mezclar con agroquímicos de reacción básica .

FITOTOXICIDAD

VITAL no es fitotóxico en los cultivos recomendados si se siguen las recomendaciones dadas en la etiqueta. La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar solo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



PRECAUCIÓN

