

“LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
 “MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Ligeramente irritante ocular.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Almacenar en lugares frescos y sombreados, que no superen los 30 °C.
- Almacenar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado alejado de alimentos y medicinas para uso humano y veterinario.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y lávese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante la manipulación y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS.

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de contacto con la piel, enjuagar el área con abundante agua fresca y lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca.
- En caso de ingestión, se recomienda inducir al vómito y consultar al médico.
- Antídoto: No posee antídoto. Tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
SAMU 106 - INFOSALUD: 113
BITEC AGRO Telf.: 923535562

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.
- No aplicar en zonas con napas freáticas superficiales o con suelos altamente permeables.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

VITAL

AGENTE DE CONTROL BIOLÓGICO MICROBIANO
FUNGICIDA AGRÍCOLA
CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

COMPOSICIÓN:

Trichoderma asperellum.....2.1 x 10⁹ UFC/ml (20%)
 Aditivos.....c.s.p 1L (80%)

Registro N° - SENASA

Titular de Registro

BITEC AGRO
 Sector Longar (Predio la Huaca con U.C. No. 42259)
 San Juan Bautista - Ica - PERÚ
 Telf.: 923535562

Formulador:

BITEC AGRO
 Sector Longar (Predio la Huaca con U.C. No. 42259)
 San Juan Bautista - Ica - PERÚ
 Telf.: 923535562

Importador y Distribuidor:

BITEC AGRO
 Sector Longar (Predio la Huaca con U.C. No. 42259)
 San Juan Bautista - Ica - PERÚ
 Telf.: 923535562



Fecha de Formulación:
 N° de Lote:

Contenido Neto: **20 LITROS**

Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

VITAL es un fungicida biológico, producido a base de *Trichoderma asperellum*, es un hongo con propiedades antagonistas, como la competencia, micoparasitismo y antibiosis, las cuales actúan en contra de los hongos fitopatógenos.

Para la preparación de la mezcla es necesario regular el pH del agua en un rango de 5.5 a 6.5, ya que no trabaja con pH alcalino. Llenar el recipiente de la mezcla hasta la mitad con agua, agregar la cantidad de producto que se va a utilizar, agitar y mezclar homogéneamente (se recomienda utilizar un dispersante y adherente químico, para mejores resultados) completar con agua hasta llenar el tanque. En la aplicación de VITAL en el campo, se recomienda aplicarlo en el haz y envés de las hojas.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGA		DOSIS L/ha	P.C. (días)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO		
Arándano	“Alternaria”	<i>Alternaria alternata</i>	1	N.A.

P.C.: Período de Carencia **N.A.:** No aplica

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se recomienda realizar 01 aplicación de VITAL por campaña, considerando 01 campaña al año.

PERIODO DE REINGRESO

No entre a las áreas tratadas durante las 04 primeras horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

VITAL es compatible con insecticidas, bioinsumos, fertilizantes foliares, promotores de crecimiento vegetal y algunos fungicidas y bactericidas. Antes de usarlo en mezcla se debe hacer una prueba de compatibilidad. No mezclar con aguas duras ni alcalinas. No mezclar con agroquímicos de reacción básica.

FITOTOXICIDAD

VITAL no es fitotóxico en los cultivos recomendados si se siguen las recomendaciones dadas en la etiqueta. La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar solo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



PRECAUCIÓN

