

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA, ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO  
“MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas dese utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Cynaimidazole
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y mostrar la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito sin supervivencia médica. No administrar nada por vía oral si la persona esta inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- No existe antídoto específico. Tratamiento sintomático.

TELEFONOS DE EMERGENCIA

SAMU: 106 AGRILAB PERU S.R.L.: 01-653-2290

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS -

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces éste envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Muy tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos cinco (05) metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

# KILAT 40 SC

## PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRICOLA

### FUNGICIDA AGRÍCOLA

### SUSPENSION CONCENTRADA (SC)

Composicion:

Cyazofamid ..... 400 g/L  
Aditivos ..... c.s.p. 1 L

Registro PQUA N° - SENASA

Formulado por: SPACHEM, S.L.

Dirección: San Roque 15, 12004, Castellón - España.  
Telf: 34-964-342-626 Fax: 34-964-213-697

Titular e Importado por: AGRILAB PERU S.R.L

Dirección: Jr. Sáenz Peña N° 344, Dpto. 105, Magdalena del Mar,  
Lima -Perú.  
Telf: 01 653-2290

Nº. de Lote:

Contenido neto: **10 L**

F. de Formulación:

F. de Vencimiento:

NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN  
NOCIVO EN CONTACTO CON LA PIEL  
NOCIVO SI SE INHALA.

MUY TOXICO PARA ORGANISMOS  
ACUÁTICOS



# PELIGRO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

KILAT 40 SC, es un fungicida de contacto, es un inhibidor de la succinacitocromoc C reductasa (SCR), inhibe todas las etapas del ciclo de vida de los hongos, afecta la germinación y formación de zoosporangios, motilidad de zoosporas y crecimiento micelial. Llenar con agua hasta la mitad el tanque de aplicación, agregar la dosis recomendada y remover, finalmente completar con agua la capacidad total del tanque, remover y aplicar.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

| CULTIVO | PLAGA        |                               | Dosis (L/Ha) | P.C. (Días) | LMR (ppm) |
|---------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------|-----------|
|         | Nombre común | Nombre científico             |              |             |           |
| PAPA    | Rancha       | <i>Phytophthora infestans</i> | 0.25         | 7           | 0.01      |

PC.: Periodo de Carenia.

LMR: Límite Máximo de Residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se puede realizar máximo 1 aplicación por campaña, considerando 2 campañas por año. Momento de Aplicación: Al desarrollo vegetativo.

PERIODO DE REINGRESO:

No ingresar al área tratada hasta 12 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

No compatible con materiales de alta acidez o alcalinidad.

FITOTOXICIDAD:

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrán ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar solo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en éste envase correspondan a la anotada en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si se requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

CATEGORIA TOXICOLOGICA 4  
LIGERAMENTE PELIGROSO

