

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, no beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto, cámbiese, báñese con abundante agua y jabón.
- Use el equipo de protección adecuada y completo necesario para realizar con seguridad las operaciones de manejo, preparación y aplicación del producto.
- No almacenar ni transportar alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Guarde el producto en un lugar seguro y bajo llave.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua y jabón las partes afectadas y retirar la ropa contaminada.
 - En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia durante 15 minutos.
 - Si el producto ha sido ingerido no es necesario provocar el vómito ni administrar medicamentos, es suficiente con beber abundante agua.
 - Consiga atención médica y muéstrela la etiqueta.
- Nota al Médico:
- DL Oral Aguda > 2000 mg/Kg 50
 - DL Dermal Aguda > 2000 mg/Kg 50
- Antídoto: No requiere de antídoto ni tratamiento específico, adopte medidas sintomáticas en caso de alergia en personas susceptibles.

Teléf. Emergencia: SAMU: 106

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo.
- Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- El producto es biodegradable, no es un contaminante del ambiente.
- El producto no es tóxico a peces, aves, abejas y organismos acuáticos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

PIGGYApply®

INSECTICIDA BIOLÓGICO

CONCENTRADO SOLUBLE (CS)

Composición:

Lecanicillium lecanii 10e8 UFC

Aditivos c.s.p. 1 L

Reg. N° 200-SENASA-PBA-ACBM

Titular de registro:

ARRAIZ S.A.C.

Av. del Pinar No 180, Of. 804, Chacarilla
Santiago de Surco - LIMA - PERÚ

Formulado por:

Sociedad de Inversiones y Comercial Bio-Apply Ltda.

La Esperanza S/N. Peumo. Región de O'Higgins - Chile

Tel.: +56 9 9280 0017 - www.bio-apply.cl

Importador y Distribuidor:



Tattersall Peru S.A.

AV. HUAROCHIRI S/N MZA. E LOTE 20

URB. STA. RAQUEL 3RA ETAPA – ATE - LIMA - PERÚ

Fecha de Formulación:

N° Lote :

Contenido Neto: 10 L

Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO - NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO

ATENCIÓN

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

PIGGY-Apply® es un insecticida biológico de contacto estable bajo condiciones ambientales adversas de campo. Cuando PIGGY-Apply® entra en contacto con el insecto, éste reconoce al patógeno adheriéndose a su cutícula. Los metabolitos secundarios activos que perforan la cutícula de la plaga logran abrir el camino para el ingreso del principio activo. Una vez en el interior de la plaga, PIGGY-Apply® se multiplica produciendo una lisis, vaciamiento celular y su posterior muerte.

AGITAR ANTES DE USAR

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

Cultivo	Plaga		Dosis		PC (DÍAS)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	L/ha	L/200L		
Vid	Cochinilla	<i>Planococcus citri</i>	4 a 6 L	0.6 a 0.8	N.A.	N.A.
	Thrips amarillo	<i>Scirtothrips dorsalis</i>	4,8 a 6 L	0.8 a 1.0	N.A.	N.A.
Arándano	Thrips amarillo	<i>Scirtothrips dorsalis</i>	4 a 5 L	0.8 a 1.0	N.A.	N.A.
	Cochinilla harinosa	<i>Planococcus citri</i>	4 a 5 L	0.8 a 1.0	N.A.	N.A.

PC: Periodo de Carencia / LMR Límite Máximo de Residuos. / NA: No aplica

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Las aplicaciones deben realizarse cuando haya inicios de ataque del insecto o se observen los primeros daños, y cuando las condiciones climáticas sean favorables para el desarrollo de la plaga. Por lo que se recomienda evaluar permanentemente el cultivo para determinar el momento adecuado de aplicación. Aplicar con una frecuencia de 7 días, se puede aplicar alternando las aplicaciones con insecticidas químicos o de otros mecanismos de acción, aplicar durante las primeras horas de la mañana o al atardecer.

SIN RESTRICCIONES EN NÚMERO Y FRECUENCIA DE APLICACIONES.

PERÍODO DE REINGRESO

No tiene restricciones de reingreso post aplicación.

COMPATIBILIDAD

Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad, es compatible con la mayoría de insecticidas químicos de uso frecuente, excepto cúpricos. Es incompatible con fungicidas químicos y productos de reacción altamente alcalina (>pH 8).

FITOTOXICIDAD

No presenta fitotoxicidad en los cultivos recomendados.

No genera ningún tipo de depósito o manchado sobre frutos.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

