

15 cm

REGIDOR

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Composición:

Fluopicolide.....	62.5 g/L
Propamocarb HCL	625 g/L
Aditivos.....	c.s.p. 1 L

Reg. PQUA N° - SENASA

Titular del Registro:
SHARDA PERU SAC
Calle Las Castañitas 138
Urb. El Palomar, San Isidro
Teléfono: 222-2695

Formulado por:
SHARDA CROP CHEM LIMITED
CHINA OFFICE
Room 1803, B Zone, Yunting building,
No. 216 Qingguoxiang, Changzhou,
Jiangsu, CHINA. Telf: 0519-88172050

Importado y distribuido por:
PERU FERTIL E.I.R.L.
Jr. Neón 5681 - Zona Industrial Infantas
Los Olivos - Lima - Perú
Teléfono: 949845833 / 999698801
perufertil@hotmail.com



Contenido Neto: 20 L

Nº Lote:
Fecha de Form.:
Fecha de Venc.:

Nocivo en caso de Ingestión
Nocivo en contacto con la piel
Nocivo si se inhala

Muy Tóxico para organismos acuáticos



PELIGRO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

REGIDOR es un fungicida que contiene dos ingredientes activos Fluopicolide y Propamocarb hydrochloride. Fluopicolide presenta actividad antiesporulante y acción específica contra pseudohongos Oomicetos. Propamocarb Hydrochloride influye en el metabolismo del Oomiceto y actúa como antiesporulante e inhibe la síntesis de fosfolípidos y ácidos grasos.

SISTEMA DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN

SISTEMA DE REPARACIÓN Y APLICACIÓN
Para la preparación de la mezcla del producto **REGIDOR**, llene el cilindro de aplicación con agua limpia hasta la mitad y luego agregue el producto revolviendo constantemente. Completar luego hasta el volumen deseado. **REGIDOR** se aplica empleando equipos de aspersión manual, a motor o montados sobre el tractor.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	PLAGA		DOSIS	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico	L/Ha		
Papa	Rancha	<i>Phytophthora infestans</i>	0.6 - 0.8*	14	0.2 0.3

PC: Período de carencia en días LMR: Límite máximo de residuos en partes por millón (ppm)

* Gasto de agua = 200 L/ha

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar durante el desarrollo vegetativo del cultivo de papa, cuando se observen los primeros síntomas de la enfermedad. Se recomienda realizar como máximo 1 aplicación por campaña, considerando 2 campañas al año.

PERIODO DE REINGRESO

PERIODO DE REINGRESO
No ingrese a las áreas tratadas hasta 12 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayoría de insecticidas y fungicidas de uso común, sin embargo, se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrán ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar solo la dosis señalada en el cuadro de usos

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

CATEGORIA 4
LIGERAMENTE PELIGROSO

