$48,0 \pm 0,3$ **1,0 ± 0,**3 **1,0 ± 0,**3 "LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETQIUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS" INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
ITAZOLE 250 EW es un fungicida sistémico perteneciente al grupo de los triazoles su uso
está destinado a campos abiertos de cultivos de espárrago para prevenir y controlar el ataque del hongo Puccinia asparagi.
ITAZOLE 250 EW tiene efectos sobre la síntesis del ergosterol interrumpiéndola y alterando el desarrollo del hongo.
Las aplicaciones deberán realizarse en horas tempranas del día, evitando las horas de mayor radiación solar o fuertes vientos o presencia de precipitación.
Para su aplicación, mezclar la dosis recomendada en un poco de agua hasta obtener una
suspensión uniforme. Luego vaciar el contenido en un cilindro o tanque de aplicación y completar con agua hasta la capacidad total. Aplicar con una mochila
manual o motorizada buscando obtener un tamaño de gota fina para una adecuada cobertura del cultivo. ITAZOLE 250 EW PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN: -Moderadamente irritante a los ojos. -Ligeramente irritante a la piel. Irritante a las vías respiratorias. PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA -irritante a las vias respiratorias.
-No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación de producto.
-Conservar este producto en el envase original, etiquetado y herméticamente cerrado, en un ambiente seco, sombreado y bien ventilado.
-No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, bebidas, medicinas ni forrajes.
-Después de manipular el producto, bañarse con abundante aqua y jabón, cambiarse y lavar la ropa contaminada.
-Utilizar ropa protectora durante el manipuleo, mezcla y aplicación del producto y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
-El producto es nocivo por ingestión, contacto con la piel e inhalación.
-Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento. **FUNGICIDA AGRÍCOLA** "CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO" PLAGA **EMULSIÓN ACEITE EN AGUA** CULTIVO L/200 L (días) NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO (ppm) Composición: INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:
-Grupo químico Triazoles.
-En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar el paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
-Cuidado. Evite el contacto. Posible carcinógeno.
-En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por 15 minutos. En caso de contacto con la piel, quitarse la ropa contaminada y lavarse CAFÉ 0.200 21 0.04 Tebuconazole . Rova del cafeto Hemileia vastatrix Aditivos . 0.150 14 0.05 ESPÁRRAGO Rova del espárrago Puccinia asparagi con abundante agua y jabón. En ambos casos buscar atención médica.
-No se ha determinado antídoto específico.
-Nota al médico: Lavado gástrico, tratamiento sintomático y de sostén. Carbón activado. Registro: PQUA Nº 253-SENASA ARROZ Pyricularia 0.200 35 1.5 CICOTOX, Teléf.: 328-7398 ESSALUD, Teléf.: 0801-10200 ITAGRO S.A., (01) 349-6805 P.C.: Periodo de carencia en días. L.M.R.: Límite máximo de residuos en partes por millón. +1 Titular del Registro: mportado v Distribuido por: ITAGRO S.A., (01) 349-6805

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESCHOS Y ENVASES VACÍOS:

-Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

-Los sobrantes deberán ser llevados a un vertedero aprobado y enterrarlos, teniendo en cuenta de no contaminar ríos o agua potable.

-No reutilizar los envases.

-Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

-Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado. ITAGRO S.A. ITHGROS FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN


Para el espárago, el número de aplicaciones por campaña pueden ser hasta 5.

Para café y arroz realizar 01 aplicación por campaña. Considerar 01 campaña al año.

Aplicar el producto cuando haya presencia del patógeno en el campo, rotándolo con otros productos según programa de manejo integrado de plagas. PERIODO DE REINGRESO No entre a las áreas tratadas durante las primeras 24 horas después de la aplicación. Formulado por: Contenido Neto: 20 L SUNDAT (S) PTE Ltd. MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE: 26 Gul Crescent Singapore 629532, Tel: (65)68612460 ITAZOLE 250 EW en general se aplica solo con un surfactante. -Peligroso para organismos acuáticos. -No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos. Nº de Lote: Se recomienda no mezclar ITAZOLE 250 EW con concentrados emulsionables F. de Form.: "Ver parte superior" Fax: (65)68620287 -No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto. F. de Venc.: FITOTOXICIDAD -Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
-Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
-El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
-En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin ITAZOLE 250 EW no es fitotóxico al cultivo y dosis indicada en la etiqueta. NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** NO EXPLOSIVO RESPONSABILIDAD CIVIL
El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. MODERADAMENTE PELIGROSO Ŋ DAÑINO

LOGO ITAGRO

14,5



T. LAVADO PANTONE 343 C

