

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

DUOPROTEKT 625 WG

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)

Composición:

Cyprodinil	375 g/kg
Fludioxonil	250 g/kg
Aditivos	csp 1 kg

Reg. PQUA N° XXXX-SENASA

Titular del registro, importador y distribuidor:



AGRIMAC GROUP E.I.R.L.

Cal. Noruega Urb. La Trinidad 2472, Lima, Perú.

Teléfono: 992826615

Formulado por:

PROTEKTING PHYTOSANITARY, S.L.

Sant Gabriel 50, 08950, Esplugues de Llobregat, España

Teléfono: +34 93201 1750

Contenido Neto: **250 g**

N° de Lote:

Fecha de formulación:

Fecha de vencimiento:

Nocivo en caso de ingestión /
Nocivo en contacto con la piel /
Nocivo si se inhala

Muy tóxico para
organismos acuáticos



PELIGRO

**"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Durante la manipulación y aplicación, y para ingresar al área tratada de acuerdo al período de reentrada (24 horas) use camisa de manga larga, pantalón largo, botas, visor, tapabocas o máscara y guantes.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Mantener el producto en el envase original, etiquetado y cerrado, alejado de alimentos y medicinas para uso humano y veterinario, bajo condiciones que garanticen su conservación.
- El uso inadecuado de este producto causa daños a la salud y al ambiente.
- No almacenar en casa de habitación.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

RELATIVAS A PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico: Cyprodinil: Anilino-pyrimidine, Fludioxonil: Phenylpyrrole.

- En caso de intoxicación, llame al médico, inmediatamente o lleve al paciente al médico y muestre la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados. Retirar lentes de contacto si los hubiera.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación: retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIAS:

**SAMU: 106
AGRICAM GROUP E.I.R.L.: 992826615**

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido inutilite la funda o bolsa cortándola. Entréguela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Muy tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.

- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el sitio destinados por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

DUOPROTEKT 625 WG contiene dos activos. Cyprodinil es de acción sistémico y de contacto, inhibe la biosíntesis de metionina y la secreción de enzimas hidrolíticas, causando interferencia en el ciclo fúngico principalmente durante las fases de penetración y crecimiento micelial dentro del tejido vegetal y Fludioxonil de acción por contacto; que bloquea la acción de una enzima, una proteína-quinasa, encargada de catalizar la fosforilación de la enzima reguladora de la síntesis del glicerol que interviene en la osmoregulación de los hongos, así mismo inhibe la germinación de las esporas y el crecimiento de los tubos germinales y micelio en la superficie de los tejidos afectados (hojas, tallos, flores).

DUOPROTEKT 625 WG se aplica en forma de aspersión foliar, para la preparación de la mezcla, llene el cilindro o tanque de aplicación con agua limpia hasta la mitad y luego agregue el producto revolviendo constantemente. Complete luego hasta el volumen deseado. Se aplica con cualquier equipo convencional terrestre en buen estado (pulverizador manual o accionado por el tractor) y debidamente calibrado, que asegure una adecuada cobertura foliar.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se recomienda realizar como máximo 1 aplicación por campaña, considerando 1 campaña al año. Aplicar en forma preventiva o a la aparición de los primeros síntomas de la enfermedad.

PERIODO DE REINGRESO

No ingresar al área tratada hasta después de 24 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD

DUOPROTEKT 625 WG es compatible con la mayoría de plaguicidas, excepto con ácidos fuertes y sustancias alcalinas. Sin embargo, se recomienda hacer una prueba de compatibilidad previa.

FITOTOXICIDAD

DUOPROTEKT 625 WG no es fitotóxico en los cultivos indicados a las dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	Kg/200 L	Kg/ha		
Palto	Muerte regresiva	<i>Lasiodiplodia theobromae</i>	0.2	1.0	1	1* 1.5**
Vid	Podredumbre gris / Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.2	1.0	7	3* 2**

PC: Período de carencia **LMR:** Límite máximo de residuos

*Cyprodinil **Fludioxonil

Categoría toxicológica 4: LIGERAMENTE PELIGROSO

