Formuladores:
BASF SA / BIESTERFELD SHANGHAI CO., LTD. / FARMEX S.A. / SINOCHEM AGRO CO. LTD
HEFEI WORLD CHEMICAL INDUSTRY CO.,LTD. / ADAMA ANDINA B.V.,SUCURSAL COLOMBIA
OURO FINO QUIMICA S.A

Etiqueta de 10 L

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Cuidado, evite el contacto, posible carcinógeno. - Causa irritación moderada a los ojos. - Este producto puede ser mortal si se ingiere accidentalmente. - Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación. - No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. - Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón. - Conservar este producto en su envase original, bien tapado, etiquetado y alejado de alimentos para consumo humano o animal. - Ningún envase que haya contenido plaguicidas deberá utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo humano.- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

Grupo químico: dinitroanilinas. - En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta. - En caso de ingestión accidental, colocar al paciente en posición tranquila. No inducir al vómito, especialmente si el paciente está inconsciente. - En caso de inhalación, trasladar al afectado a un lugar con aire fresco y proporcionar ayuda respiratoria si fuera necesario. - En caso de contacto con la piel, quitarse las prendas contaminadas y lavar el área de la piel afectada con abundante agua y jabón. - En caso de contacto con los ojos, efectuar una limpieza con bastante agua, aplicada en los ojos en forma de chorro durante 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. -Antídoto: no hay antídoto específico. Tratamiento sintomático.**- Teléfono de Emergencia: SAMU: 106, FARMEX S.A.: (01) 630-6400, CISPROQUIM: 080-050-847.**

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos. - No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos. - No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto. - Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros. - Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestres. No permitir animales en el área tratada. - El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva. - En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

Arrow®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

COMPOSICIÓN:
Pendimethalin..... 400 g/L
Aditivos.....c.s.p...1 L

Reg. PQUA N° 204 - SENASA

Titular del Registro: FARMEX S.A.

Formulado por:
SINOCHEM AGRO CO. LTD
17-19th Fl, No.33 He Nan Road(s), Shanghai 200002, China.
Telf.: +86-21-63289888

Importado y distribuido por:

Farmex

Calle Dean Valdivia Nº 148 Piso 7
San Isidro, Lima 27 - PERU
Teléfono: (01) 630-6400
www.farmex.com.pe

CONTENIDO NETO: 10 L

N° de Lote:
Fecha de formulación:
Fecha de vencimiento:

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO **NO EXPLOSIVO**

® Marca registrada de FARMEX S.A.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

ARROW® es un herbicida selectivo que se emplea para el control preemergente de malezas gramíneas anuales y ciertas malezas de hoja ancha. **ARROW®** actúa inhibiendo la división celular en los puntos de crecimiento de las malezas que están germinando. Es absorbido por raíces y hojas. **ARROW®** se aplica en pulverización al suelo empleando equipos de aspersión manuales, a motor o montados sobre el tractor. Para la preparación de la mezcla, llene el cilindro o tanque de aplicación con agua limpia hasta la mitad y luego agregue el producto revolviendo constantemente. Complete luego hasta el volumen deseado.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS L/ha	PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
Alcachofa	Amor seco Moco de pavo Pata de gallina Pega pega Verdolaga	*Bidens pilosa* *Echinochloa crus-galli* *Eleusine indica* *Setaria verticillata* *Portulaca oleracea*	2 - 3	90	0.1
Pimiento	Cerraja Hierba gallinazo Lechera Verdolaga Yuyo hembra Kiwicha	*Sonchus oleraceus* *Chenopodium murale* *Euphorbia heterophylla* *Portulaca oleracea* *Amaranthus hybridus* *Amaranthus caudatus*	2 - 3	70	0.05
Cebolla	Amor seco Cadillo Verdolaga	*Bidens pilosa* *Cenchrus echinatus* *Portulaca oleracea*	2	60	0.1
Maíz	Amor seco Capuli Chamico Grama china Hierba gallinazo Hierba mora Lechera Pega pega Verdolaga Yuyo hembra	*Bidens pilosa* *Physalis peruviana* *Datura stramonium* *Sorghum halepense* *Chenopodium murale* *Solanum nigrum* *Euphorbia heterophylla* *Setaria verticillata* *Portulaca oleracea* *Amaranthus hybridus*	2 - 3	60	0.05

PC: Período de carencia (días), **LMR:** Límite máximo de residuos (ppm).

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Aplicar en preemergencia de las malezas. No realizar más de una aplicación por campaña/año.

PERÍODO DE REINGRESO: No reingresar sin protección a un campo aplicado hasta 12 horas después de la aplicación. Mantener alejado al ganado durante este período.

COMPATIBILIDAD: Es compatible con la mayoría de los plaguicidas comúnmente usados a excepción de los de reacción alcalina. Antes de hacer la mezcla con otros plaguicidas se debe probar la compatibilidad entre los productos mezclándolos en su debida proporción en un envase pequeño.

FITOTOXICIDAD: ARROW® no ha mostrado síntomas de fitotoxicidad luego de ser aplicado en los cultivos y a las dosis recomendadas. La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

Versión 01

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO