MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

FREBINE

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRICOLA

GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)

COMPOSICIÓN:

Flubendiamide.....200 g/kg
Aditivos.....c.s.p. 1kg

PQUA N° -SENASA

TITULAR DE REGISTRO:
RAINBOW AGROSCIENCES S.A.C
Av. Alfredo Benavides N° 2150, Int. 701
Urb. El Rosedal, Miraflores, Lima - Perú.
Teléfono: (511) 678-9544

Rainbow
all about growing

FORMULADOR:
QINGDAO RAINBOW CHEMICAL CO., LTD
No 8 Haipubei road, Pingdu Xinhe Eco-Chemical Science
and Technology Industry Base, Qingdao, Shandong, China
Teléfono: 0086-532 - 68081298
E-mail: rainbowagro@rainbowagro.com
www.rainbowagro.com

IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR:
SOLANDINA PERU S.A.C.
Av. Alfredo Benavides N° 2150, Int. 701
Urb. El Rosedal, Miraflores, Lima - Perú.
Teléfono: +51 992 763 127

Contenido Neto: 1 KG
Lote N°:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

Nocivo en caso de ingestión
Nocivo en contacto con la piel
Nocivo si se inhala
Muy Toxico para organismos acuáticos

ATENCIÓN

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA

300mm

220mm

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

-Este producto es nocivo en caso de ingestión, nocivo en contacto con la piel.
-Causa irritación moderada a los ojos.
-No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
-Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada después de las 24 horas.
-Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
-No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
-Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
-Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para almacenar alimentos, bebidas u otros productos.
-Almacenar en un lugar fresco, seco y con buena ventilación, lejos de la casa-habitación y de fuentes de calor.
-Manipular los envases con cuidado para evitar roturas y derrames.
-Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

Grupo químico: Benzene-dicarboxamide

-En caso de ingestión no inducir al vómito. Llevar al afectado al médico inmediatamente.
-En caso de contacto con la piel: lavar con abundante agua durante 10 minutos y cambiarse la ropa contaminada
-En caso de contacto con los ojos: lavar con agua corriente durante 15 minutos. Trasladar al paciente al médico, especialista (oftalmólogo).
-En caso de inhalación: trasladar al afectado a un ambiente fresco con buena ventilación, conducirlo al médico.
-Nota al médico: El producto no tiene antídoto específico, proporcionar tratamiento sintomático.
- En caso de EMERGENCIA.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

SAMU: 106
RAINBOW AGROSCIENCES: 01- 678-9544

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- No aplicar si se verifica la presencia polinizadores, abejas y/o artrópodos benéficos en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
- Notificar a los apicultores cercanos antes de aplicar el producto, para el confinamiento y protección de los colmenares.
- No aplicar cerca de las colmenas de las abejas.
- Aplicar sólo a primeras horas de la mañana o al atardecer cuando las abejas no estén polinizando.
- Evitar que la aplicación esté dirigida a otro tipo de vegetación en floración que atraen polinizadores.
- Muy tóxico para organismos acuáticos.
- Aplicar temprano en las mañanas o muy en las tardes. Evitar la deriva por el viento.
- No contaminar las fuentes de agua como los ríos, estanques o arroyos con los sobrantes del producto, envases vacíos o restos de la aplicación.
- Respetar una banda de no aplicación hacia los cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
-En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación a aguas subterráneas.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

FREBINE es un insecticida que actúa por contacto e ingestión. Afecta el equilibrio de iones de calcio independientemente del equilibrio de iones sodio o potasio, lo que provoca la contracción del musculo esquelético de los insectos.

Agitar el contenido de **FREBINE** en su envase original, luego verter la dosis recomendada en un cilindro conteniendo la mitad de agua limpia. Agitar hasta lograr una mezcla homogénea y luego completar con agua hasta obtener el volumen deseado. La aplicación puede ser realizada con diversos equipos de aplicación terrestre. La absorción de **FREBINE** puede ser mejorada con el uso de un coadyuvante apropiado.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	N. Común	N. científico	Kg/200L	Kg/ha		
Espárrago	Gusano perforador grande de la bellota	*Heliothis virescens*	-	0.20 – 0.25	14	0.01
Palto	Gusano medidor	*Sabulodes aegrotata*	0.05 - 0.075	0.3 - 0.45*	1	0.01

PC: Periodo de carencia
LMR: Límite máximo de residuos
*Gasto de agua: 1200 L/Ha.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Puede ser aplicado 1 vez por campaña considerando una campaña al año. El producto debe ser aplicado previa evaluación del campo, cuando se tenga presencia de la plaga, la indicación aplica para los cultivos de palto y esparrago.Para el cultivo de palto, aplicar durante el desarrollo vegetativo o maduración del cultivo. Aplicar cuando el suelo se encuentre en capacidad de campo y cuando la temperatura no supere los 30°C.

PERIODO DE REINGRESO

Se debe reingresar al campo tratado después de transcurridas las 24 horas.

COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios. En caso de dudas efectuar pruebas de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD

La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

Categoría Toxicológica 4

"LIGERAMENTE PELIGROSO"

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DE SENASA

300mm

220mm

MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

FREBINE

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRICOLA

GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)

COMPOSICIÓN:

Flubendiamide.....200 g/kg
Aditivos.....c.s.p. 1kg

PQUA N° -SENASA

TITULAR DE REGISTRO:
RAINBOW AGROSCIENCES S.A.C
Av. Alfredo Benavides N° 2150, Int. 701
Urb. El Rosedal, Miraflores, Lima - Perú.
Teléfono: (511) 678-9544

Rainbow
all about growing

FORMULADOR:
SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO., LTD.
Binhai Economic Development Area, Weifang Shandong
262737, China Telf: 86-531-88875231
Fax: 86-531-88875232
E-mail: rainbowagro@rainbowagro.com
www.rainbowagro.com

IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR:
SOLANDINA PERU S.A.C.
Av. Alfredo Benavides N° 2150, Int. 701
Urb. El Rosedal, Miraflores, Lima - Perú.
Teléfono: +51 992 763 127

Contenido Neto: 1 KG
Lote N°:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

Nocivo en caso de ingestión
Nocivo en contacto con la piel
Nocivo si se inhala
Muy Toxico para organismos acuáticos

ATENCIÓN

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA

300mm

220mm

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

-Este producto es nocivo en caso de ingestión, nocivo en contacto con la piel.
-Causa irritación moderada a los ojos.
-No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
-Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada después de las 24 horas.
-Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
-No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
-Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
-Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para almacenar alimentos, bebidas u otros productos.
-Almacenar en un lugar fresco, seco y con buena ventilación, lejos de la casa-habitación y de fuentes de calor.
-Manipular los envases con cuidado para evitar roturas y derrames.
-Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

Grupo químico: Benzene-dicarboxamide

-En caso de ingestión no inducir al vómito. Llevar al afectado al médico inmediatamente.
-En caso de contacto con la piel: lavar con abundante agua durante 10 minutos y cambiarse la ropa contaminada
-En caso de contacto con los ojos: lavar con agua corriente durante 15 minutos. Trasladar al paciente al médico, especialista (oftalmólogo).
-En caso de inhalación: trasladar al afectado a un ambiente fresco con buena ventilación, conducirlo al médico.
-Nota al médico: El producto no tiene antídoto específico, proporcionar tratamiento sintomático.
- En caso de EMERGENCIA.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

SAMU: 106
RAINBOW AGROSCIENCES: 01- 678-9544

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- No aplicar si se verifica la presencia polinizadores, abejas y/o artrópodos benéficos en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
- Notificar a los apicultores cercanos antes de aplicar el producto, para el confinamiento y protección de los colmenares.
- No aplicar cerca de las colmenas de las abejas.
- Aplicar sólo a primeras horas de la mañana o al atardecer cuando las abejas no estén polinizando.
- Evitar que la aplicación esté dirigida a otro tipo de vegetación en floración que atraen polinizadores.
- Muy tóxico para organismos acuáticos.
- Aplicar temprano en las mañanas o muy en las tardes. Evitar la deriva por el viento.
- No contaminar las fuentes de agua como los ríos, estanques o arroyos con los sobrantes del producto, envases vacíos o restos de la aplicación.
- Respetar una banda de no aplicación hacia los cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
-En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación a aguas subterráneas.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

FREBINE es un insecticida que actúa por contacto e ingestión. Afecta el equilibrio de iones de calcio independientemente del equilibrio de iones sodio o potasio, lo que provoca la contracción del musculo esquelético de los insectos.

Agitar el contenido de **FREBINE** en su envase original, luego verter la dosis recomendada en un cilindro conteniendo la mitad de agua limpia. Agitar hasta lograr una mezcla homogénea y luego completar con agua hasta obtener el volumen deseado. La aplicación puede ser realizada con diversos equipos de aplicación terrestre. La absorción de **FREBINE** puede ser mejorada con el uso de un coadyuvante apropiado.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	N. Común	N. científico	Kg/200L	Kg/ha		
Esparrago	Gusano perforador grande de la bellota	*Heliothis virescens*	-	0.20 – 0.25	14	0.01
Palto	Gusano medidor	*Sabulodes aegrotata*	0.05-0.075	0.3 – 0.45*	1	0.01

PC: Periodo de carencia
LMR: Límite máximo de residuos
*Gasto de agua: 1200 L/Ha

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Puede ser aplicado 1 vez por campaña considerando una campaña al año. El producto debe ser aplicado previa evaluación del campo, cuando se tenga presencia de la plaga, la indicación aplica para los cultivos de palto y esparrago.Para el cultivo de palto, aplicar durante el desarrollo vegetativo o maduración del cultivo. Aplicar cuando el suelo se encuentre en capacidad de campo y cuando la temperatura no supere los 30°C.

PERIODO DE REINGRESO

Se debe reingresar al campo tratado después de transcurridas las 24 horas.

COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios. En caso de dudas efectuar pruebas de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD

La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

Categoría Toxicológica 4

"LIGERAMENTE PELIGROSO"

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DE SENASA

300mm

220mm

MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

FREBINE

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRICOLA

GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)

COMPOSICIÓN:
Flubendiamide.....200 g/kg
Aditivos.....c.s.p. 1kg

PQUA N° -SENASA

TITULAR DE REGISTRO:
RAINBOW AGROSCIENCES S.A.C
Av. Alfredo Benavides N° 2150, Int. 701
Urb. El Rosedal, Miraflores, Lima - Perú.
Teléfono: (511) 678-9544

FORMULADOR:
QINGDAO RAINBOW CHEMICAL CO., LTD
No 8 Haipubei road, Pingdu Xinhe Eco-Chemical Science and Technology Industry Base, Qingdao, Shandong, China
Teléfono: 0086-532 - 68081298
E-mail: rainbowagro@rainbowagro.com
www.rainbowagro.com

IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR:
SOLANDINA PERU S.A.C.
Av. Alfredo Benavides N° 2150, Int. 701
Urb. El Rosedal, Miraflores, Lima - Perú.
Teléfono: +51 992 763 127

Contenido Neto: 25 KG
Lote N°:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

Nocivo en caso de ingestión
Nocivo en contacto con la piel
Nocivo si se inhala
Muy Toxico para organismos acuáticos

ATENCIÓN

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA

300mm

150mm

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

-Este producto es nocivo en caso de ingestión, nocivo en contacto con la piel.
-Causa irritación moderada a los ojos.
-No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
-Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada después de las 24 horas.
-Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para almacenar alimentos, bebidas u otros productos.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
-No reutilizar los envases vacíos para almacenar alimentos, bebidas u otros productos.
-Almacenar en un lugar fresco, seco y con buena ventilación, lejos de la casa-habitación y de fuentes de calor.
-Manipular los envases con cuidado para evitar roturas y derrames.
-Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS
Grupo químico: Benzene-dicarboxamide

-En caso de ingestión no inducir al vómito. Llevar al afectado al médico inmediatamente.
-En caso de contacto con la piel: lavar con abundante agua durante 10 minutos y cambiarse la ropa contaminada
-En caso de contacto con los ojos: lavar con agua corriente durante 15 minutos. Trasladar al paciente al médico, especialista (oftalmólogo).
-En caso de inhalación: trasladar al afectado a un ambiente fresco con buena ventilación, conducirlo al médico.
-Nota al médico: El producto no tiene antídoto específico, proporcionar tratamiento sintomático.
- En caso de EMERGENCIA.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
SAMU: 106
RAINBOW AGROSCIENCES: 01- 678-9544

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

-No aplicar si se verifica la presencia polinizadores, abejas y/o artrópodos benéficos en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
-Notificar a los apicultores cercanos antes de aplicar el producto, para el confinamiento y protección de los colmenares.
-No aplicar cerca de las colmenas de las abejas.
-Aplicar sólo a primeras horas de la mañana o al atardecer cuando las abejas no estén polinizando.
-Evitar que la aplicación esté dirigida a otro tipo de vegetación en floración que atraen polinizadores.
-Muy tóxico para organismos acuáticos
-Aplicar temprano en las mañanas o muy en las tardes. Evitar la deriva por el viento.
-No contaminar las fuentes de agua como los ríos, estanques o arroyos con los sobrantes del producto, envases vacíos o restos de la aplicación.
-Respetar una banda de no aplicación hacia los cuerpos de agua de al menos 10 metros.
-Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
-El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
-En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación a aguas subterráneas.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

FREBINE es un insecticida que actúa por contacto e ingestión. Afecta el equilibrio de iones de calcio independientemente del equilibrio de iones sodio o potasio, lo que provoca la contracción del musculo esquelético de los insectos.

Agitar el contenido de **FREBINE** en su envase original, luego verter la dosis recomendada en un cilindro conteniendo la mitad de agua limpia. Agitar hasta lograr una mezcla homogénea y luego completar con agua hasta obtener el volumen deseado. La aplicación puede ser realizada con diversos equipos de aplicación terrestre. La absorción de **FREBINE** puede ser mejorada con el uso de un coadyuvante apropiado.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	N. Común	N. científico	Kg/200L	Kg/ha		
Esparrago	Gusano perforador grande de la bellota	*Heliothis virescens*	-	0.20 – 0.25	14	0.01
Palto	Gusano medidor	*Sabulodes aegrotata*	0.05-0.075	0.3 – 0.45*	1	0.01

PC: Periodo de carencia LMR: Límite máximo de residuos *Gasto de agua: 1200 L/Ha

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Puede ser aplicado 1 vez por campaña considerando una campaña al año. El producto debe ser aplicado previa evaluación del campo, cuando se tenga presencia de la plaga, la indicación aplica para los cultivos de palto y esparrago.Para el cultivo de palto, aplicar durante el desarrollo vegetativo o maduración del cultivo. Aplicar cuando el suelo se encuentre en capacidad de campo y cuando la temperatura no supere los 30°C.

PERIODO DE REINGRESO

Se debe reingresar al campo tratado después de transcurridas las 24 horas.

COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios. En caso de dudas efectuar pruebas de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD

La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

Categoría Toxicológica 4 "LIGERAMENTE PELIGROSO"

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA

300mm

150mm

MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

FREBINE

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)

COMPOSICIÓN:
Flubendiamide.....200 g/kg
Aditivos.....c.s.p. 1kg

PQUA N° -SENASA

TITULAR DE REGISTRO:
RAINBOW AGROSCIENCES S.A.C
Av. Alfredo Benavides N° 2150, Int. 701
Urb. El Rosedal, Miraflores, Lima - Perú.
Teléfono: (511) 678-9544

FORMULADOR:
SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO., LTD.
Binhai Economic Development Area, Weifang Shandong
262737, China Telf: 86-531-88875231
Fax: 86-531-88875232
E-mail: rainbowagro@rainbowagro.com
www.rainbowagro.com

IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR:
SOLANDINA PERU S.A.C.
Av. Alfredo Benavides N° 2150, Int. 701
Urb. El Rosedal, Miraflores, Lima - Perú.
Teléfono: +51 992 763 127

Contenido Neto: 25 KG
Lote N°:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

Nocivo en caso de ingestión
Nocivo en contacto con la piel
Nocivo si se inhala
Muy Toxico para organismos acuáticos

ATENCIÓN

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA

300mm

150mm

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN
-Este producto es nocivo en caso de ingestión, nocivo en contacto con la piel.
-Causa irritación moderada a los ojos.
-No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
-Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada después de las 24 horas.
-Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para almacenar alimentos, bebidas u otros productos.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
-No reutilizar los envases vacíos para almacenar alimentos, bebidas u otros productos.
-Almacenar en un lugar fresco, seco y con buena ventilación, lejos de la casa-habitación y de fuentes de calor.
-Manipular los envases con cuidado para evitar roturas y derrames.
-Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS
Grupo químico: Benzene-dicarboxamide
-En caso de ingestión no inducir al vómito. Llevar al afectado al médico inmediatamente.
-En caso de contacto con la piel: lavar con abundante agua durante 10 minutos y cambiarse la ropa contaminada
-En caso de contacto con los ojos: lavar con agua corriente durante 15 minutos. Trasladar al paciente al médico, especialista (oftalmólogo).
-En caso de inhalación: trasladar al afectado a un ambiente fresco con buena ventilación, conducirlo al médico.
-Nota al médico: El producto no tiene antídoto específico, proporcionar tratamiento sintomático.
- En caso de EMERGENCIA.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
SAMU: 106
RAINBOW AGROSCIENCES: 01- 678-9544

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE
-No aplicar si se verifica la presencia polinizadores, abejas y/o artrópodos benéficos en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
-Notificar a los apicultores cercanos antes de aplicar el producto, para el confinamiento y protección de los colmenares.
-No aplicar cerca de las colmenas de las abejas.
-Aplicar sólo a primeras horas de la mañana o al atardecer cuando las abejas no estén polinizando.
-Evitar que la aplicación esté dirigida a otro tipo de vegetación en floración que atraen polinizadores.
-Muy tóxico para organismos acuáticos
-Aplicar temprano en las mañanas o muy en las tardes. Evitar la deriva por el viento.
-No contaminar las fuentes de agua como los ríos, estanques o arroyos con los sobrantes del producto, envases vacíos o restos de la aplicación.
-Respetar una banda de no aplicación hacia los cuerpos de agua de al menos 10 metros.
-Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
-El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
-En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación a aguas subterráneas.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
FREBINE es un insecticida que actúa por contacto e ingestión. Afecta el equilibrio de iones de calcio independientemente del equilibrio de iones sodio o potasio, lo que provoca la contracción del musculo esquelético de los insectos.

Agitar el contenido de **FREBINE** en su envase original, luego verter la dosis recomendada en un cilindro conteniendo la mitad de agua limpia. Agitar hasta lograr una mezcla homogénea y luego completar con agua hasta obtener el volumen deseado. La aplicación puede ser realizada con diversos equipos de aplicación terrestre. La absorción de **FREBINE** puede ser mejorada con el uso de un coadyuvante apropiado.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	N. Común	N. científico	Kg/200L	Kg/ha		
Esparrago	Gusano perforador grande de la bellota	*Heliothis virescens*	-	0.20 – 0.25	14	0.01
Palto	Gusano medidor	*Sabulodes aegrotata*	0.05-0.075	0.3 – 0.45*	1	0.01

PC: Periodo de carencia LMR: Límite máximo de residuos *Gasto de agua: 1200 L/Ha

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN
Puede ser aplicado 1 vez por campaña considerando una campaña al año. El producto debe ser aplicado previa evaluación del campo, cuando se tenga presencia de la plaga, la indicación aplica para los cultivos de palto y esparrago.Para el cultivo de palto, aplicar durante el desarrollo vegetativo o maduración del cultivo. Aplicar cuando el suelo se encuentre en capacidad de campo y cuando la temperatura no supere los 30°C.

PERIODO DE REINGRESO
Se debe reingresar al campo tratado después de transcurridas las 24 horas.

COMPATIBILIDAD
Es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios. En caso de dudas efectuar pruebas de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD
La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL:
El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

Categoría Toxicológica 4 "LIGERAMENTE PELIGROSO"

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA

300mm

150mm

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

FREBINE

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)

COMPOSICIÓN:

Flubendiamide.....200 g/kg
Aditivos.....c.s.p. 1kg

PQUA N° -SENASA

TITULAR DE REGISTRO:
RAINBOW AGROSCIENCES S.A.C
Av. Alfredo Benavides N° 2150, Int. 701
Urb. El Rosedal, Miraflores, Lima - Perú.
Teléfono: (511) 678-9544

Rainbow
all about growing

FORMULADOR:
QINGDAO RAINBOW CHEMICAL CO., LTD
No 8 Haipubei road, Pingdu Xinhe Eco-Chemical Science
and Technology Industry Base, Qingdao, Shandong, China
Teléfono: 0086-532 - 68081298
E-mail: rainbowagro@rainbowagro.com
www.rainbowagro.com

IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR:
SOLANDINA PERU S.A.C.
Av. Alfredo Benavides N° 2150, Int. 701
Urb. El Rosedal, Miraflores, Lima - Perú.
Teléfono: +51 992 763 127

Contenido Neto: 50 G
Lote N°:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

Nocivo en caso de ingestión
Nocivo en contacto con la piel
Nocivo si se inhala
Muy Toxico para organismos acuáticos

ATENCIÓN

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA

170mm

120mm

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS
Grupo químico: Benzene-dicarboxamide
-En caso de ingestión no inducir al vómito. Llevar al afectado al médico inmediatamente.
-En caso de contacto con la piel: lavar con abundante agua durante 10 minutos y cambiarse la ropa contaminada
-En caso de contacto con los ojos: lavar con agua corriente durante 15 minutos. Trasladar al paciente al médico, especialista (oftalmólogo).
-En caso de inhalación: trasladar al afectado a un ambiente fresco con buena ventilación, conducirlo al médico.
-Nota al médico: El producto no tiene antídoto específico, proporcionar tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
SAMU: 106
RAINBOW AGROSCIENCES: 01- 678-9544

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
FREBINE es un insecticida que actúa por contacto e ingestión. Afecta el equilibrio de iones de calcio independientemente del equilibrio de iones sodio o potasio, lo que provoca la contracción del musculo esquelético de los insectos. Agitar el contenido de **FREBINE** en su envase original, luego verter la dosis recomendada en un cilindro conteniendo la mitad de agua limpia. Agitar hasta lograr una mezcla homogénea y luego completar con agua hasta obtener el volumen deseado. La aplicación puede ser realizada con diversos equipos de aplicación terrestre. La absorción de **FREBINE**puede ser mejorada con el uso de un coadyuvante apropiado.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	N. Común	N. científico	Kg/200L	Kg/ha		
Esparrago	Gusano perforador grande de la bellota	*Heliothis virescens*	-	0.20 – 0.25	14	0.01
Palto	Gusano medidor	*Sabulodes aegrotata*	0.05-0.075	0.3 – 0.45*	1	0.01

PC: Periodo de carencia LMR: Límite máximo de residuos *Gasto de agua: 1200 L/Ha

Categoría toxicológica 4 - "LIGERAMENTE PELIGROSO"

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA

170mm

120mm

"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

FREBINE

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)

COMPOSICIÓN:

Flubendiamide.....200 g/kg
Aditivos.....c.s.p. 1kg

PQUA N° -SENASA

TITULAR DE REGISTRO:
RAINBOW AGROSCIENCES S.A.C
Av. Alfredo Benavides N° 2150, Int. 701
Urb. El Rosedal, Miraflores, Lima - Perú.
Teléfono: (511) 678-9544

Rainbow
all about growing

FORMULADOR:
SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO., LTD.
Binhai Economic Development Area, Weifang Shandong
262737, China Telf: 86-531-88875231
Fax: 86-531-88875232
E-mail: rainbowagro@rainbowagro.com
www.rainbowagro.com

IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR:
SOLANDINA PERU S.A.C.
Av. Alfredo Benavides N° 2150, Int. 701
Urb. El Rosedal, Miraflores, Lima - Perú.
Teléfono: +51 992 763 127

Contenido Neto: 50 G
Lote N°:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

Nocivo en caso de ingestión
Nocivo en contacto con la piel
Nocivo si se inhala
Muy Toxico para organismos acuáticos

ATENCIÓN

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA

170mm

120mm

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS
Grupo químico: Benzene-dicarboxamide

-En caso de ingestión no inducir al vómito. Llevar al afectado al médico inmediatamente.
-En caso de contacto con la piel: lavar con abundante agua durante 10 minutos y cambiarse la ropa contaminada
-En caso de contacto con los ojos: lavar con agua corriente durante 15 minutos. Trasladar al paciente al médico, especialista (oftalmólogo).
-En caso de inhalación: trasladar al afectado a un ambiente fresco con buena ventilación, conducirlo al médico.
-Nota al médico: El producto no tiene antídoto específico, proporcionar tratamiento sintomático.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

FREBINE es un insecticida que actúa por contacto e ingestión. Afecta el equilibrio de iones de calcio independientemente del equilibrio de iones sodio o potasio, lo que provoca la contracción del musculo esquelético de los insectos.
Agitar el contenido de **FREBINE** en su envase original, luego verter la dosis recomendada en un cilindro conteniendo la mitad de agua limpia. Agitar hasta lograr una mezcla homogénea y luego completar con agua hasta obtener el volumen deseado. La aplicación puede ser realizada con diversos equipos de aplicación terrestre. La absorción de **FREBINE** puede ser mejorada con el uso de un coadyuvante apropiado.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
SAMU: 106
RAINBOW AGROSCIENCES: 01- 678-9544

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	N. Común	N. científico	Kg/200L	Kg/ha		
Esparrago	Gusano perforador grande de la bellota	*Heliothis virescens*	-	0.20 – 0.25	14	0.01
Palto	Gusano medidor	*Sabulodes aegrotata*	0.05-0.075	0.3 – 0.45*	1	0.01

PC: Periodo de carencia LMR: Límite máximo de residuos *Gasto de agua: 1200 L/Ha

Categoría toxicológica 4 - "LIGERAMENTE PELIGROSO"

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA

170mm

120mm

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

FREBINE

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)

COMPOSICIÓN:

Flubendiamide.....200 g/kg
Aditivos.....c.s.p. 1kg

PQUA N° -SENASA

TITULAR DE REGISTRO:
RAINBOW AGROSCIENCES S.A.C
Av. Alfredo Benavides N° 2150, Int. 701
Urb. El Rosedal, Miraflores, Lima - Perú.
Teléfono: (511) 678-9544

Rainbow
all about growing

FORMULADOR:
QINGDAO RAINBOW CHEMICAL CO., LTD
No 8 Haipubei road, Pingdu Xinhe Eco-Chemical Science and Technology Industry Base, Qingdao, Shandong, China
Teléfono: 0086-532 - 68081298
E-mail: rainbowagro@rainbowagro.com
www.rainbowagro.com

IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR:
SOLANDINA PERU S.A.C.
Av. Alfredo Benavides N° 2150, Int. 701
Urb. El Rosedal, Miraflores, Lima - Perú.
Teléfono: +51 992 763 127

Contenido Neto: 100 G
Lote N°:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

Nocivo en caso de ingestión
Nocivo en contacto con la piel
Nocivo si se inhala
Muy Toxico para organismos acuáticos

ATENCIÓN

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA

180mm

130mm

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS
Grupo químico: Benzene-dicarboxamide
-En caso de ingestión no inducir al vómito. Llevar al afectado al médico inmediatamente.
-En caso de contacto con la piel: lavar con abundante agua durante 10 minutos y cambiarse la ropa contaminada
-En caso de contacto con los ojos: lavar con agua corriente durante 15 minutos. Trasladar al paciente al médico, especialista (oftalmólogo).
-En caso de inhalación: trasladar al afectado a un ambiente fresco con buena ventilación, conducirlo al médico.
-Nota al médico: El producto no tiene antídoto específico, proporcionar tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
SAMU: 106
RAINBOW AGROSCIENCES: 01- 678-9544

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
FREBINE es un insecticida que actúa por contacto e ingestión. Afecta el equilibrio de iones de calcio independientemente del equilibrio de iones sodio o potasio, lo que provoca la contracción del musculo esquelético de los insectos.
Agitar el contenido de **FREBINE** en su envase original, luego verter la dosis recomendada en un cilindro conteniendo la mitad de agua limpia. Agitar hasta lograr una mezcla homogénea y luego completar con agua hasta obtener el volumen deseado. La aplicación puede ser realizada con diversos equipos de aplicación terrestre. La absorción de **FREBINE** puede ser mejorada con el uso de un coadyuvante apropiado.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	N. Común	N. científico	Kg/200L	Kg/ha		
Espárrago	Gusano perforador grande de la bellota	*Heliothis virescens*	-	0.20 – 0.25	14	0.01
Palto	Gusano medidor	*Sabulodes aegrotata*	0.05-0.075	0.3 – 0.45*	1	0.01

PC: Periodo de carencia LMR: Límite máximo de residuos *Gasto de agua: 1200 L/Ha

Categoría toxicológica 4 - "LIGERAMENTE PELIGROSO"

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA

180mm

130mm

MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

FREBINE

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)

COMPOSICIÓN:

Flubendiamide.....200 g/kg
Aditivos.....c.s.p. 1kg

PQUA N° -SENASA

TITULAR DE REGISTRO:
RAINBOW AGROSCIENCES S.A.C
Av. Alfredo Benavides N° 2150, Int. 701
Urb. El Rosedal, Miraflores, Lima - Perú.
Teléfono: (511) 678-9544

Rainbow
all about growing

FORMULADOR:
SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO., LTD.
Binhai Economic Development Area, Weifang Shandong
262737, China Telf: 86-531-88875231
Fax: 86-531-88875232
E-mail: rainbowagro@rainbowagro.com
www.rainbowagro.com

IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR:
SOLANDINA PERU S.A.C.
Av. Alfredo Benavides N° 2150, Int. 701
Urb. El Rosedal, Miraflores, Lima - Perú.
Teléfono: +51 992 763 127

Contenido Neto: 100 G
Lote N°:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

Nocivo en caso de ingestión
Nocivo en contacto con la piel
Nocivo si se inhala
Muy Toxico para organismos acuáticos

ATENCIÓN

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA

180mm

130mm

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS
Grupo químico: Benzene-dicarboxamide

-En caso de ingestión no inducir al vómito. Llevar al afectado al médico inmediatamente.
-En caso de contacto con la piel: lavar con abundante agua durante 10 minutos y cambiarse la ropa contaminada
-En caso de contacto con los ojos: lavar con agua corriente durante 15 minutos. Trasladar al paciente al médico, especialista (oftalmólogo).
-En caso de inhalación: trasladar al afectado a un ambiente fresco con buena ventilación, conducirlo al médico.
-Nota al médico: El producto no tiene antídoto específico, proporcionar tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
SAMU: 106
RAINBOW AGROSCIENCES: 01- 678-9544

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

FREBINE es un insecticida que actúa por contacto e ingestión. Afecta el equilibrio de iones de calcio independientemente del equilibrio de iones sodio o potasio, lo que provoca la contracción del musculo esquelético de los insectos.

Agitar el contenido de **FREBINE** en su envase original, luego verter la dosis recomendada en un cilindro conteniendo la mitad de agua limpia. Agitar hasta lograr una mezcla homogénea y luego completar con agua hasta obtener el volumen deseado. La aplicación puede ser realizada con diversos equipos de aplicación terrestre. La absorción de **FREBINE** puede ser mejorada con el uso de un coadyuvante apropiado.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	N. Común	N. científico	Kg/200L	Kg/ha		
Espárrago	Gusano perforador grande de la bellota	*Heliothis virescens*	-	0.20 – 0.25	14	0.01
Palto	Gusano medidor	*Sabulodes aegrotata*	0.05-0.075	0.3 – 0.45*	1	0.01

PC: Periodo de carencia LMR: Límite máximo de residuos *Gasto de agua: 1200L/Ha

Categoría toxicológica 4 - "LIGERAMENTE PELIGROSO"

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA

180mm

130mm

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

FREBINE

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)

COMPOSICIÓN:

Flubendiamide.....200 g/kg
Aditivos.....c.s.p. 1kg

PQUA N° -SENASA

TITULAR DE REGISTRO:
RAINBOW AGROSCIENCES S.A.C
Av. Alfredo Benavides N° 2150, Int. 701
Urb. El Rosedal, Miraflores, Lima - Perú.
Teléfono: (511) 678-9544

Rainbow
all about growing

FORMULADOR:
QINGDAO RAINBOW CHEMICAL CO., LTD
No 8 Haipubei road, Pingdu Xinhe Eco-Chemical Science
and Technology Industry Base, Qingdao, Shandong, China
Teléfono: 0086-532 - 68081298
E-mail: rainbowagro@rainbowagro.com
www.rainbowagro.com

IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR:
SOLANDINA PERU S.A.C.
Av. Alfredo Benavides N° 2150, Int. 701
Urb. El Rosedal, Miraflores, Lima - Perú.
Teléfono: +51 992 763 127

Contenido Neto: 250 G
Lote N°:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

Nocivo en caso de ingestión
Nocivo en contacto con la piel
Nocivo si se inhala
Muy Toxico para organismos acuáticos



ATENCIÓN

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA

210mm

150mm

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

-Este producto es nocivo en caso de ingestión, nocivo en contacto con la piel.
-Causa irritación moderada a los ojos.
-No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
-Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada después de las 24 horas.
-Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
-No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
-Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para almacenar alimentos, bebidas u otros productos.
-Almacenar en un lugar fresco, seco y con buena ventilación, lejos de la casa-habitación y de fuentes de calor.
-Manipular los envases con cuidado para evitar roturas y derrames.
-Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

Grupo químico: Benzene-dicarboxamide

-En caso de ingestión no inducir al vómito. Llevar al afectado al médico inmediatamente.
-En caso de contacto con la piel: lavar con abundante agua durante 10 minutos y cambiarse la ropa contaminada
-En caso de contacto con los ojos: lavar con agua corriente durante 15 minutos. Trasladar al paciente al médico, especialista (oftalmólogo).
-En caso de inhalación: trasladar al afectado a un ambiente fresco con buena ventilación, conducirlo al médico.
-Nota al médico: El producto no tiene antídoto específico, proporcionar tratamiento sintomático.
- En caso de EMERGENCIA.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

SAMU: 106
RAINBOW AGROSCIENCES: 01- 678-9544

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de
usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- No aplicar si se verifica la presencia polinizadores, abejas y/o artrópodos benéficos en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
-Notificar a los apicultores cercanos antes de aplicar el producto, para el confinamiento y protección de los colmenares.
-No aplicar cerca de las colmenas de las abejas.
-Aplicar sólo a primeras horas de la mañana o al atardecer cuando las abejas no estén polinizando.
-Evitar que la aplicación esté dirigida a otro tipo de vegetación en floración que atraen polinizadores.
-Muy tóxico para organismos acuáticos
-Aplicar temprano en las mañanas o muy en las tardes. Evitar la deriva por el viento.
-No contaminar las fuentes de agua como los ríos, estanques o arroyos con los sobrantes del producto, envases vacíos o restos de la aplicación.
-Respetar una banda de no aplicación hacia los cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación a aguas subterráneas.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

FREBINE es un insecticida que actúa por contacto e ingestión. Afecta el equilibrio de iones de calcio independientemente del equilibrio de iones sodio o potasio, lo que provoca la contracción del musculo esquelético de los insectos.

Agitar el contenido de **FREBINE** en su envase original, luego verter la dosis recomendada en un cilindro conteniendo la mitad de agua limpia. Agitar hasta lograr una mezcla homogénea y luego completar con agua hasta obtener el volumen deseado. La aplicación puede ser realizada con diversos equipos de aplicación terrestre. La absorción de **FREBINE** puede ser mejorada con el uso de un coadyuvante apropiado.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	N. Común	N. científico	Kg/200L	Kg/ha		
Esparrago	Gusano perforador grande de la bellota	*Heliothis virescens*	-	0.20–0.25	14	0.01
Palto	Gusano medidor	*Sabulodes aegrotata*	0.05 - 0.075	0.3 - 0.45*	1	0.01

PC: Periodo de carencia LMR: Límite máximo de residuos
*Gasto de agua: 1200 L/Ha

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Puede ser aplicado 1 vez por campaña considerando una campaña al año. El producto debe ser aplicado previa evaluación del campo, cuando se tenga presencia de la plaga, la indicación aplica para los cultivos de palto y esparrago.Para el cultivo de palto, aplicar durante el desarrollo vegetativo o maduración del cultivo. Aplicar cuando el suelo se encuentre en capacidad de campo y cuando la temperatura no supere los 30°C.

PERIODO DE REINGRESO

Se debe reingresar al campo tratado después de transcurridas las 24 horas.

COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios. En caso de dudas efectuar pruebas de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD

La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

Categoría Toxicológica 4
"LIGERAMENTE PELIGROSO"

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA

210mm

150mm

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

FREBINE

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)

COMPOSICIÓN:

Flubendiamide.....200 g/kg
Aditivos.....c.s.p. 1kg

PQUA N° -SENASA

TITULAR DE REGISTRO:
RAINBOW AGROSCIENCES S.A.C
Av. Alfredo Benavides N° 2150, Int. 701
Urb. El Rosedal, Miraflores, Lima - Perú.
Teléfono: (511) 678-9544

Rainbow
all about growing

FORMULADOR:
SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO., LTD.
Binhai Economic Development Area, Weifang Shandong
262737, China Telf: 86-531-88875231
Fax: 86-531-88875232
E-mail: rainbowagro@rainbowagro.com
www.rainbowagro.com

IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR:
SOLANDINA PERU S.A.C.
Av. Alfredo Benavides N° 2150, Int. 702
Urb. El Rosedal, Miraflores, Lima - Perú.
Teléfono: +51 992 763 127

Contenido Neto: 250 G
Lote N°:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

Nocivo en caso de ingestión
Nocivo en contacto con la piel
Nocivo si se inhala
Muy Toxico para organismos acuáticos



ATENCIÓN

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA

210mm

150mm

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

-Este producto es nocivo en caso de ingestión, nocivo en contacto con la piel.
-Causa irritación moderada a los ojos.
-No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
-Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada después de las 24 horas.
-Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
-No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
-Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para almacenar alimentos, bebidas u otros productos.
-Almacenar en un lugar fresco, seco y con buena ventilación, lejos de la casa-habitación y de fuentes de calor.
-Manipular los envases con cuidado para evitar roturas y derrames.
-Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

Grupo químico: Benzene-dicarboxamide

-En caso de ingestión no inducir al vómito. Llevar al afectado al médico inmediatamente.
-En caso de contacto con la piel: lavar con abundante agua durante 10 minutos y cambiarse la ropa contaminada
-En caso de contacto con los ojos: lavar con agua corriente durante 15 minutos. Trasladar al paciente al médico, especialista (oftalmólogo).
-En caso de inhalación: trasladar al afectado a un ambiente fresco con buena ventilación, conducirlo al médico.
-Nota al médico: El producto no tiene antídoto específico, proporcionar tratamiento sintomático.
- En caso de EMERGENCIA.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

SAMU: 106
RAINBOW AGROSCIENCES: 01- 678-9544

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- No aplicar si se verifica la presencia polinizadores, abejas y/o artrópodos benéficos en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
-Notificar a los apicultores cercanos antes de aplicar el producto, para el confinamiento y protección de los colmenares.
-No aplicar cerca de las colmenas de las abejas.
-Aplicar sólo a primeras horas de la mañana o al atardecer cuando las abejas no estén polinizando.
-Evitar que la aplicación esté dirigida a otro tipo de vegetación en floración que atraen polinizadores.
-Muy tóxico para organismos acuáticos
-Aplicar temprano en las mañanas o muy en las tardes. Evitar la deriva por el viento.
-No contaminar las fuentes de agua como los ríos, estanques o arroyos con los sobrantes del producto, envases vacíos o restos de la aplicación.
-Respetar una banda de no aplicación hacia los cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación a aguas subterráneas.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

FREBINE es un insecticida que actúa por contacto e ingestión. Afecta el equilibrio de iones de calcio independientemente del equilibrio de iones sodio o potasio, lo que provoca la contracción del musculo esquelético de los insectos.

Agitar el contenido de **FREBINE** en su envase original, luego verter la dosis recomendada en un cilindro conteniendo la mitad de agua limpia. Agitar hasta lograr una mezcla homogénea y luego completar con agua hasta obtener el volumen deseado. La aplicación puede ser realizada con diversos equipos de aplicación terrestre. La absorción de **FREBINE** puede ser mejorada con el uso de un coadyuvante apropiado.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	N. Común	N. científico	Kg/200L	Kg/ha		
Espárrago	Gusano perforador grande de la bellota	*Heliothis virescens*	-	0.20 – 0.25	14	0.01
Palto	Gusano medidor	*Sabulodes aegrotata*	0.05-0.075	0.3 - 0.45*	1	0.01

PC: Periodo de carencia LMR: Límite máximo de residuos
*Gasto de agua: 1200 L/Ha

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Puede ser aplicado 1 vez por campaña considerando una campaña al año. El producto debe ser aplicado previa evaluación del campo, cuando se tenga presencia de la plaga, la indicación aplica para los cultivos de palto y esparrago.Para el cultivo de palto, aplicar durante el desarrollo vegetativo o maduración del cultivo. Aplicar cuando el suelo se encuentre en capacidad de campo y cuando la temperatura no supere los 30°C.

PERIODO DE REINGRESO

Se debe reingresar al campo tratado después de transcurridas las 24 horas.

COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios. En caso de dudas efectuar pruebas de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD

La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

Categoría Toxicológica 4
"LIGERAMENTE PELIGROSO"

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA

210mm

150mm

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

FREBINE

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)

COMPOSICIÓN:

Flubendiamide.....200 g/kg
Aditivos.....c.s.p. 1kg

PQUA N° -SENASA

TITULAR DE REGISTRO:
RAINBOW AGROSCIENCES S.A.C
Av. Alfredo Benavides N° 2150, Int. 701
Urb. El Rosedal, Miraflores, Lima - Perú.
Teléfono: (511) 678-9544

Rainbow
all about growing

FORMULADOR:
QINGDAO RAINBOW CHEMICAL CO., LTD
No 8 Haipubei road, Pingdu Xinhe Eco-Chemical Science
and Technology Industry Base, Qingdao, Shandong, China
Teléfono: 0086-532 - 68081298
E-mail: rainbowagro@rainbowagro.com
www.rainbowagro.com

IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR:
SOLANDINA PERU S.A.C.
Av. Alfredo Benavides N° 2150, Int. 701
Urb. El Rosedal, Miraflores, Lima - Perú.
Teléfono: +51 992 763 127

Contenido Neto: 500 G
Lote N°:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

Nocivo en caso de ingestión
Nocivo en contacto con la piel
Nocivo si se inhala
Muy Toxico para organismos acuáticos

ATENCIÓN

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA

280mm

190mm

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

-Este producto es nocivo en caso de ingestión, nocivo en contacto con la piel.
-Causa irritación moderada a los ojos.
-No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
-Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada después de las 24 horas.
-Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
-No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
-Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
-Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para almacenar alimentos, bebidas u otros productos.
-Almacenar en un lugar fresco, seco y con buena ventilación, lejos de la casa-habitación y de fuentes de calor.
-Manipular los envases con cuidado para evitar roturas y derrames.
-Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

Grupo químico: Benzene-dicarboxamide

-En caso de ingestión no inducir al vómito. Llevar al afectado al médico inmediatamente.
-En caso de contacto con la piel: lavar con abundante agua durante 10 minutos y cambiarse la ropa contaminada
-En caso de contacto con los ojos: lavar con agua corriente durante 15 minutos. Trasladar al paciente al médico, especialista (oftalmólogo).
-En caso de inhalación: trasladar al afectado a un ambiente fresco con buena ventilación, conducirlo al médico.
-Nota al médico: El producto no tiene antídoto específico, proporcionar tratamiento sintomático.
- En caso de EMERGENCIA.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

SAMU: 106
RAINBOW AGROSCIENCES: 01- 678-9544

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- No aplicar si se verifica la presencia polinizadores, abejas y/o artrópodos benéficos en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
-Notificar a los apicultores cercanos antes de aplicar el producto, para el confinamiento y protección de los colmenares.
-No aplicar cerca de las colmenas de las abejas.
-Aplicar sólo a primeras horas de la mañana o al atardecer cuando las abejas no estén polinizando.
-Evitar que la aplicación esté dirigida a otro tipo de vegetación en floración que atraen polinizadores.
-Muy tóxico para organismos acuáticos
-Aplicar temprano en las mañanas o muy en las tardes. Evitar la deriva por el viento.
-No contaminar las fuentes de agua como los ríos, estanques o arroyos con los sobrantes del producto, envases vacíos o restos de la aplicación.
- Respetar una banda de no aplicación hacia los cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación a aguas subterráneas.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

FREBINE es un insecticida que actúa por contacto e ingestión. Afecta el equilibrio de iones de calcio independientemente del equilibrio de iones sodio o potasio, lo que provoca la contracción del musculo esquelético de los insectos.

Agitar el contenido de **FREBINE** en su envase original, luego verter la dosis recomendada en un cilindro conteniendo la mitad de agua limpia. Agitar hasta lograr una mezcla homogénea y luego completar con agua hasta obtener el volumen deseado. La aplicación puede ser realizada con diversos equipos de aplicación terrestre. La absorción de **FREBINE** puede ser mejorada con el uso de un coadyuvante apropiado.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	N. Común	N. científico	Kg/200L	Kg/ha		
Espárrago	Gusano perforador grande de la bellota	*Heliothis virescens*	-	0.20 – 0.25	14	0.01
Palto	Gusano medidor	*Sabulodes aegrotata*	0.05-0.075	0.3 - 0.45*	1	0.01

PC: Periodo de carencia
LMR: Límite máximo de residuos
*Gasto de agua: 1200 L/Ha

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Puede ser aplicado 1 vez por campaña considerando una campaña al año. El producto debe ser aplicado previa evaluación del campo, cuando se tenga presencia de la plaga, la indicación aplica para los cultivos de palto y esparrago.Para el cultivo de palto, aplicar durante el desarrollo vegetativo o maduración del cultivo. Aplicar cuando el suelo se encuentre en capacidad de campo y cuando la temperatura no supere los 30°C.

PERIODO DE REINGRESO

Se debe reingresar al campo tratado después de transcurridas las 24 horas.

COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios. En caso de dudas efectuar pruebas de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD

La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

Categoría Toxicológica 4
"LIGERAMENTE PELIGROSO"

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DE SENASA

280mm

190mm

"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

FREBINE

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)

COMPOSICIÓN:

Flubendiamide.....200 g/kg
Aditivos.....c.s.p. 1kg

PQUA N° -SENASA

TITULAR DE REGISTRO:
RAINBOW AGROSCIENCES S.A.C
Av. Alfredo Benavides N° 2150, Int. 701
Urb. El Rosedal, Miraflores, Lima - Perú.
Teléfono: (511) 678-9544

Rainbow
all about growing

FORMULADOR:
SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO., LTD.
Binhai Economic Development Area, Weifang Shandong
262737, China Telf: 86-531-88875231
Fax: 86-531-88875232
E-mail: rainbowagro@rainbowagro.com
www.rainbowagro.com

IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR:
SOLANDINA PERU S.A.C.
Av. Alfredo Benavides N° 2150, Int. 701
Urb. El Rosedal, Miraflores, Lima - Perú.
Teléfono: +51 992 763 127

Contenido Neto: 500 G
Lote N°:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

Nocivo en caso de ingestión
Nocivo en contacto con la piel
Nocivo si se inhala
Muy Toxico para organismos acuáticos

ATENCIÓN

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA

280mm

190mm

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

-Este producto es nocivo en caso de ingestión, nocivo en contacto con la piel.
-Causa irritación moderada a los ojos.
-No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
-Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada después de las 24 horas.
-Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
-No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
-Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
-Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para almacenar alimentos, bebidas u otros productos.
-Almacenar en un lugar fresco, seco y con buena ventilación, lejos de la casa-habitación y de fuentes de calor.
-Manipular los envases con cuidado para evitar roturas y derrames.
-Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

Grupo químico: Benzene-dicarboxamide

-En caso de ingestión no inducir al vómito. Llevar al afectado al médico inmediatamente.
-En caso de contacto con la piel: lavar con abundante agua durante 10 minutos y cambiarse la ropa contaminada
-En caso de contacto con los ojos: lavar con agua corriente durante 15 minutos. Trasladar al paciente al médico, especialista (oftalmólogo).
-En caso de inhalación: trasladar al afectado a un ambiente fresco con buena ventilación, conducirlo al médico.
-Nota al médico: El producto no tiene antídoto específico, proporcionar tratamiento sintomático.
- En caso de EMERGENCIA.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

SAMU: 106
RAINBOW AGROSCIENCES: 01- 678-9544

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- No aplicar si se verifica la presencia polinizadores, abejas y/o artrópodos benéficos en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
-Notificar a los apicultores cercanos antes de aplicar el producto, para el confinamiento y protección de los colmenares.
-No aplicar cerca de las colmenas de las abejas.
-Aplicar sólo a primeras horas de la mañana o al atardecer cuando las abejas no estén polinizando.
-Evitar que la aplicación esté dirigida a otro tipo de vegetación en floración que atraen polinizadores.
-Muy tóxico para organismos acuáticos
-Aplicar temprano en las mañanas o muy en las tardes. Evitar la deriva por el viento.
-No contaminar las fuentes de agua como los ríos, estanques o arroyos con los sobrantes del producto, envases vacíos o restos de la aplicación.
- Respetar una banda de no aplicación hacia los cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación a aguas subterráneas.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

FREBINE es un insecticida que actúa por contacto e ingestión. Afecta el equilibrio de iones de calcio independientemente del equilibrio de iones sodio o potasio, lo que provoca la contracción del musculo esquelético de los insectos.

Agitar el contenido de **FREBINE** en su envase original, luego verter la dosis recomendada en un cilindro conteniendo la mitad de agua limpia. Agitar hasta lograr una mezcla homogénea y luego completar con agua hasta obtener el volumen deseado. La aplicación puede ser realizada con diversos equipos de aplicación terrestre. La absorción de **FREBINE** puede ser mejorada con el uso de un coadyuvante apropiado.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	N. Común	N. científico	Kg/200L	Kg/ha		
Espárrago	Gusano perforador grande de la bellota	*Heliothis virescens*	-	0.20–0.25	14	0.01
Palto	Gusano medidor	*Sabulodes aegrotata*	0.05-0.075	0.3-0.45*	1	0.01

PC: Periodo de carencia
LMR: Límite máximo de residuos
*Gasto de agua: 1200L/Ha

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Puede ser aplicado 1 vez por campaña. El producto debe ser aplicado previa evaluación del campo, cuando se tenga presencia de la plaga, la indicación aplica para los cultivos de palto y esparrago.

PERIODO DE REINGRESO

Se debe reingresar al campo tratado después de transcurridas las 24 horas.

COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios. En caso de dudas efectuar pruebas de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD

La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

Categoría Toxicológica 4
"LIGERAMENTE PELIGROSO"

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA

280mm

190mm

"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

FREBINE

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)

COMPOSICIÓN:

Flubendiamide.....200 g/kg
Aditivos.....c.s.p. 1kg

PQUA N° -SENASA

TITULAR DE REGISTRO:
RAINBOW AGROSCIENCES S.A.C
Av. Alfredo Benavides N° 2150, Int. 701
Urb. El Rosedal, Miraflores, Lima - Perú.
Teléfono: (511) 678-9544

Rainbow
all about growing

FORMULADOR:
QINGDAO RAINBOW CHEMICAL CO., LTD
No 8 Haipubei road, Pingdu Xinhe Eco-Chemical Science and Technology Industry Base, Qingdao, Shandong, China
Teléfono: 0086-532 - 68081298
E-mail: rainbowagro@rainbowagro.com
www.rainbowagro.com

IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR:
SOLANDINA PERU S.A.C.
Av. Alfredo Benavides N° 2150, Int. 701
Urb. El Rosedal, Miraflores, Lima - Perú.
Teléfono: +51 992 763 127

Contenido Neto: 800 G
Lote N°:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

Nocivo en caso de ingestión
Nocivo en contacto con la piel
Nocivo si se inhala
Muy Toxico para organismos acuáticos

ATENCIÓN

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA

320mm

200mm

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

-Este producto es nocivo en caso de ingestión, nocivo en contacto con la piel.
-Causa irritación moderada a los ojos.
-No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
-Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada después de las 24 horas.
-Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
-No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
-Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para almacenar alimentos, bebidas u otros productos.
-Almacenar en un lugar fresco, seco y con buena ventilación, lejos de la casa-habitación y de fuentes de calor. - Manipular los envases con cuidado para evitar roturas y derrames.
-Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS
Grupo químico: Benzene-dicarboxamide

-En caso de ingestión no inducir al vómito. Llevar al afectado al médico inmediatamente.
-En caso de contacto con la piel: lavar con abundante agua durante 10 minutos y cambiarse la ropa contaminada
-En caso de contacto con los ojos: lavar con agua corriente durante 15 minutos. Trasladar al paciente al médico, especialista (oftalmólogo).
-En caso de inhalación: trasladar al afectado a un ambiente fresco con buena ventilación, conducirlo al médico.
-Nota al médico: El producto no tiene antídoto específico, proporcionar tratamiento sintomático.
- En caso de EMERGENCIA.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
SAMU: 106
RAINBOW AGROSCIENCES: 01- 678-9544

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- No aplicar si se verifica la presencia polinizadores, abejas y/o artrópodos benéficos en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
-Notificar a los apicultores cercanos antes de aplicar el producto, para el confinamiento y protección de los colmenares.
-No aplicar cerca de las colmenas de las abejas.
-Aplicar sólo a primeras horas de la mañana o al atardecer cuando las abejas no estén polinizando.
-Evitar que la aplicación esté dirigida a otro tipo de vegetación en floración que atraen polinizadores.
-Muy tóxico para organismos acuáticos
-Aplicar temprano en las mañanas o muy en las tardes. Evitar la deriva por el viento.
-No contaminar las fuentes de agua como los ríos, estanques o arroyos con los sobrantes del producto, envases vacíos o restos de la aplicación.
-Respetar una banda de no aplicación hacia los cuerpos de agua de al menos 10 metros.
-Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación a aguas subterráneas.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

FREBINE es un insecticida que actúa por contacto e ingestión. Afecta el equilibrio de iones de calcio independientemente del equilibrio de iones sodio o potasio, lo que provoca la contracción del músculo esquelético de los insectos.

Agitar el contenido de **FREBINE** en su envase original, luego verter la dosis recomendada en un cilindro conteniendo la mitad de agua limpia. Agitar hasta lograr una mezcla homogénea y luego completar con agua hasta obtener el volumen deseado. La aplicación puede ser realizada con diversos equipos de aplicación terrestre. La absorción de **FREBINE** puede ser mejorada con el uso de un coadyuvante apropiado.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	N. Común	N. científico	Kg/200L	Kg/ha		
Espárrago	Gusano perforador grande de la bellota	*Heliothis virescens*	-	0.20 – 0.25	14	0.01
Palto	Gusano medidor	*Sabulodes aegrotata*	0.05-0.075	0.3 - 0.45*	1	0.01

PC: Periodo de carencia
LMR: Límite máximo de residuos
*Gasto de agua: 1200 L/Ha

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Puede ser aplicado 1 vez por campaña considerando una campaña al año. El producto debe ser aplicado previa evaluación del campo, cuando se tenga presencia de la plaga, la indicación aplica para los cultivos de palto y esparrago.Para el cultivo de palto, aplicar durante el desarrollo vegetativo o maduración del cultivo. Aplicar cuando el suelo se encuentre en capacidad de campo y cuando la temperatura no supere los 30°C.

PERIODO DE REINGRESO

Se debe reingresar al campo tratado después de transcurridas las 24 horas.

COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios. En caso de dudas efectuar pruebas de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD

La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

Categoría Toxicológica 4
"LIGERAMENTE PELIGROSO"

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA

320mm

200mm

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

FREBINE

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)

COMPOSICIÓN:

Flubendiamide.....200 g/kg
Aditivos.....c.s.p. 1kg

PQUA N° -SENASA

TITULAR DE REGISTRO:
RAINBOW AGROSCIENCES S.A.C
Av. Alfredo Benavides N° 2150, Int. 701
Urb. El Rosedal, Miraflores, Lima - Perú.
Teléfono: (511) 678-9544

Rainbow
all about growing

FORMULADOR:
SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO., LTD.
Binhai Economic Development Area, Weifang Shandong
262737, China Telf: 86-531-88875231
Fax: 86-531-88875232
E-mail: rainbowagro@rainbowagro.com
www.rainbowagro.com

IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR:
SOLANDINA PERU S.A.C.
Av. Alfredo Benavides N° 2150, Int. 701
Urb. El Rosedal, Miraflores, Lima - Perú.
Teléfono: +51 992 763 127

Contenido Neto: 800 G
Lote N°:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

Nocivo en caso de ingestión
Nocivo en contacto con la piel
Nocivo si se inhala
Muy Toxico para organismos acuáticos

ATENCIÓN

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA

320mm

200mm

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

-Este producto es nocivo en caso de ingestión, nocivo en contacto con la piel.
-Causa irritación moderada a los ojos.
-No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
-Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada después de las 24 horas.
-Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
-No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
-Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para almacenar alimentos, bebidas u otros productos.
-Almacenar en un lugar fresco, seco y con buena ventilación, lejos de la casa-habitación y de fuentes de calor. - Manipular los envases con cuidado para evitar roturas y derrames.
-Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

Grupo químico: Benzene-dicarboxamide

-En caso de ingestión no inducir al vómito. Llevar al afectado al médico inmediatamente.
-En caso de contacto con la piel: lavar con abundante agua durante 10 minutos y cambiarse la ropa contaminada
-En caso de contacto con los ojos: lavar con agua corriente durante 15 minutos. Trasladar al paciente al médico, especialista (oftalmólogo).
-En caso de inhalación: trasladar al afectado a un ambiente fresco con buena ventilación, conducirlo al médico.
-Nota al médico: El producto no tiene antídoto específico, proporcionar tratamiento sintomático.
- En caso de EMERGENCIA.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

SAMU: 106
RAINBOW AGROSCIENCES: 01- 678-9544

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- No aplicar si se verifica la presencia polinizadores, abejas y/o artrópodos benéficos en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
-Notificar a los apicultores cercanos antes de aplicar el producto, para el confinamiento y protección de los colmenares.
-No aplicar cerca de las colmenas de las abejas.
-Aplicar sólo a primeras horas de la mañana o al atardecer cuando las abejas no estén polinizando.
-Evitar que la aplicación esté dirigida a otro tipo de vegetación en floración que atraen polinizadores.
-Muy tóxico para organismos acuáticos
-Aplicar temprano en las mañanas o muy en las tardes. Evitar la deriva por el viento.
-No contaminar las fuentes de agua como los ríos, estanques o arroyos con los sobrantes del producto, envases vacíos o restos de la aplicación.
-Respetar una banda de no aplicación hacia los cuerpos de agua de al menos 10 metros.
-Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación a aguas subterráneas.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

FREBINE es un insecticida que actúa por contacto e ingestión. Afecta el equilibrio de iones de calcio independientemente del equilibrio de iones sodio o potasio, lo que provoca la contracción del músculo esquelético de los insectos.

Agitar el contenido de **FREBINE** en su envase original, luego verter la dosis recomendada en un cilindro conteniendo la mitad de agua limpia. Agitar hasta lograr una mezcla homogénea y luego completar con agua hasta obtener el volumen deseado. La aplicación puede ser realizada con diversos equipos de aplicación terrestre. La absorción de **FREBINE** puede ser mejorada con el uso de un coadyuvante apropiado.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	N. Común	N. científico	Kg/200L	Kg/ha		
Espárrago	Gusano perforador grande de la bellota	*Heliothis virescens*	-	0.20 – 0.25	14	0.01
Palto	Gusano medidor	*Sabulodes aegrotata*	0.05-0.075	0.3 - 0.45*	1	0.01

PC: Periodo de carencia
LMR: Límite máximo de residuos
*Gasto de agua: 1200 L/Ha

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Puede ser aplicado 1 vez por campaña considerando una campaña al año. El producto debe ser aplicado previa evaluación del campo, cuando se tenga presencia de la plaga, la indicación aplica para los cultivos de palto y esparrago.Para el cultivo de palto, aplicar durante el desarrollo vegetativo o maduración del cultivo. Aplicar cuando el suelo se encuentre en capacidad de campo y cuando la temperatura no supere los 30° C.

PERIODO DE REINGRESO

Se debe reingresar al campo tratado después de transcurridas las 24 horas.

COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios. En caso de dudas efectuar pruebas de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD

La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

Categoría Toxicológica 4
"LIGERAMENTE PELIGROSO"

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA

320mm

200mm

"LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

-Este producto es nocivo en caso de ingestión, nocivo en contacto con la piel.
-Causa irritación moderada a los ojos.
-No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
-Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada después de las 24 horas.
-Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
-No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
-Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para almacenar alimentos, bebidas u otros productos.
-Almacenar en un lugar fresco, seco y con buena ventilación, lejos de la casa-habitación y de fuentes de calor.
-Manipular los envases con cuidado para evitar roturas y derrames.
-Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

Grupo químico: Benzene-dicarboxamide

-En caso de ingestión no inducir al vómito. Llevar al afectado al médico inmediatamente.
- En caso de contacto con la piel: lavar con abundante agua durante 10 minutos y cambiarse la ropa contaminada
- En caso de contacto con los ojos: lavar con agua corriente durante 15 minutos. Trasladar al paciente al médico, especialista (oftalmólogo).
-En caso de inhalación: trasladar al afectado a un ambiente fresco con buena ventilación, conducirlo al médico.
- Nota al médico: El producto no tiene antídoto específico, proporcionar tratamiento sintomático.
- En caso de EMERGENCIA.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

SAMU: 106
RAINBOW AGROSCIENCES: 01- 678-9544

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- No aplicar si se verifica la presencia polinizadores, abejas y/o artrópodos benéficos en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
-Notificar a los apicultores cercanos antes de aplicar el producto, para el confinamiento y protección de los colmenares. - No aplicar cerca de las colmenas de las abejas.
-Aplicar sólo a primeras horas de la mañana o al atardecer cuando las abejas no estén polinizando.
-Evitar que la aplicación esté dirigida a otro tipo de vegetación en floración que atraen polinizadores.
-Muy tóxico para organismos acuáticos
-Aplicar temprano en las mañanas o muy en las tardes. Evitar la deriva por el viento.
-No contaminar las fuentes de agua como los ríos, estanques o arroyos con los sobrantes del producto, envases vacíos o restos de la aplicación.
-Respetar una banda de no aplicación hacia los cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación a aguas subterráneas.

FREBINE

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)

COMPOSICIÓN:

Flubendiamide.....200 g/kg
Aditivos.....c.s.p. 1kg

PQUA N° -SENASA

IUPAC:
3-iodo-N´-(2-mesyl-1,1-dimethylethyl)-N-(4-(1,2,2,2-tetrafluoro-1-(trifluoromethyl)ethyl)-o-toly)phthalamide

Formula empírica: $C_{23}H_{22}FIN_2O_4S$

Formula estructural:

N° CAS: 272451-65-7
Peso molecular: 682.39 g/mol
Nombre de los compuestos relacionados y de los ingredientes aditivos de importancia toxicológica: Ninguno
Capacidad y clase de los envases en que se comercializa el producto: 0.1, 0.15, 0.25, 0.5, 1, 25 Kg

TITULAR DE REGISTRO:
RAINBOW AGROSCIENCES S.A.C
Av. Alfredo Benavides N° 2150, Int. 701
Urb. El Rosedal, Miraflores, Lima - Perú.
Teléfono: (511) 678-9544

FORMULADOR:
QINGDAO RAINBOW CHEMICAL CO., LTD
No 8 Haipubei road, Pingdu Xinhe Eco-Chemical Science and Technology Industry Base, Qingdao, Shandong, China
Teléfono: 0086-532 - 68081298
E-mail: rainbowagro@rainbowagro.com
www.rainbowagro.com

IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR:
SOLANDINA PERU S.A.C.
Av. Alfredo Benavides N° 2150, Int. 701 Urb. El Rosedal, Miraflores, Lima - Perú. Teléfono: +51 992 763 127

Nocivo en caso de ingestión
Nocivo en contacto con la piel
Nocivo si se inhala
Muy Toxico para organismos acuáticos

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	N. Común	N. científico	Kg/200L	Kg/ha		
Esparrago	Gusano perforador grande de la bellota	*Heliothis virescens*	-	0.20 - 0.25	14	0.01
Palto	Gusano medidor	*Sabulodes aegrotata*	0.05 - 0.075	0.3 - 0.45*	1	0.01

PC: Periodo de carencia LMR: Límite máximo de residuos
*Gasto de agua: 1200 L/Ha

Modo de acción: FREBINE es un insecticida que actúa por contacto e ingestión.

Mecanismo de acción:
FREBINE afecta el equilibrio de iones de calcio independientemente del equilibrio de iones sodio o potasio, lo que provoca la contracción del musculo esquelético de los insectos.

COMPATIBILIDAD
Es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios. En caso de dudas efectuar pruebas de compatibilidad.

PERIODO DE REINGRESO
Se debe reingresar al campo tratado después de transcurridas las 24 horas.

FITOTOXICIDAD
La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos

Número máximo de aplicaciones sucesivas o por cosecha o por campaña o por año: Puede ser aplicado 1 vez por campaña considerando una campaña al año. El producto debe ser aplicado previa evaluación del campo, cuando se tenga presencia de la plaga, la indicación aplica para los cultivos de palto y esparrago.Para el cultivo de palto, aplicar durante el desarrollo vegetativo o maduración del cultivo. Aplicar cuando el suelo se encuentre en capacidad de campo y cuando la temperatura no supere los 30°C.

Métodos de aplicación:
Agitar el contenido de **FREBINE** en su envase original, luego verter la dosis recomendada en un cilindro conteniendo la mitad de agua limpia. Agitar hasta lograr una mezcla homogénea y luego completar con agua hasta obtener el volumen deseado. La aplicación puede ser realizada con diversos equipos de aplicación terrestre. La absorción de **FREBINE** puede ser mejorada con el uso de un coadyuvante apropiado.

RESPONSABILIDAD CIVIL:
El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

Categoría Toxicológica 4
"LIGERAMENTE PELIGROSO"

ATENCIÓN

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA

160mm

300mm

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

-Este producto es nocivo en caso de ingestión, nocivo en contacto con la piel.
-Causa irritación moderada a los ojos.
-No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
-Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada después de las 24 horas.
-Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
-No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
-Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para almacenar alimentos, bebidas u otros productos.
-Almacenar en un lugar fresco, seco y con buena ventilación, lejos de la casa-habitación y de fuentes de calor.
-Manipular los envases con cuidado para evitar roturas y derrames.
-Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

Grupo químico: Benzene-dicarboxamide

-En caso de ingestión no inducir al vómito. Llevar al afectado al médico inmediatamente.
- En caso de contacto con la piel: lavar con abundante agua durante 10 minutos y cambiarse la ropa contaminada
- En caso de contacto con los ojos: lavar con agua corriente durante 15 minutos. Trasladar al paciente al médico, especialista (oftalmólogo).
-En caso de inhalación: trasladar al afectado a un ambiente fresco con buena ventilación, conducirlo al médico.
- Nota al médico: El producto no tiene antídoto específico, proporcionar tratamiento sintomático.
- En caso de EMERGENCIA.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

SAMU: 106
RAINBOW AGROSCIENCES: 01- 678-9544

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- No aplicar si se verifica la presencia polinizadores, abejas y/o artrópodos benéficos en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
-Notificar a los apicultores cercanos antes de aplicar el producto, para el confinamiento y protección de los colmenares. - No aplicar cerca de las colmenas de las abejas.
-Aplicar sólo a primeras horas de la mañana o al atardecer cuando las abejas no estén polinizando.
-Evitar que la aplicación esté dirigida a otro tipo de vegetación en floración que atraen polinizadores.
-Muy tóxico para organismos acuáticos
-Aplicar temprano en las mañanas o muy en las tardes. Evitar la deriva por el viento.
-No contaminar las fuentes de agua como los ríos, estanques o arroyos con los sobrantes del producto, envases vacíos o restos de la aplicación.
-Respetar una banda de no aplicación hacia los cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación a aguas subterráneas.

FREBINE

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)

COMPOSICIÓN:

Flubendiamide.....200 g/kg
Aditivos.....c.s.p. 1kg

PQUA N° -SENASA

IUPAC:
3-iodo-N´-(2-mesyl-1,1-dimethylethyl)-N-(4-(1,2,2,2-tetrafluoro-1-(trifluoromethyl)ethyl)-o-toly)phthalamide

Formula empírica: $C_{23}H_{22}FIN_2O_4S$

Formula estructural:

N° CAS: 272451-65-7
Peso molecular: 682.39 g/mol
Nombre de los compuestos relacionados y de los ingredientes aditivos de importancia toxicológica: Ninguno
Capacidad y clase de los envases en que se comercializa el producto: 0.1, 0.15, 0.25, 0.5, 1, 25 Kg

TITULAR DE REGISTRO:
RAINBOW AGROSCIENCES S.A.C
Av. Alfredo Benavides N° 2150, Int. 701
Urb. El Rosedal, Miraflores, Lima - Perú.
Teléfono: (511) 678-9544

FORMULADOR:
SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO., LTD.
Binhai Economic Development Area, Weifang Shandong 262737, China Telf: 86-531-88875231
Fax: 86-531-88875232
E-mail: rainbowagro@rainbowagro.com
www.rainbowagro.com

IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR:
SOLANDINA PERU S.A.C.
Av. Alfredo Benavides N° 2150, Int. 702 Urb. El Rosedal, Miraflores, Lima - Perú. Teléfono: +51 992 763 127

Nocivo en caso de ingestión
Nocivo en contacto con la piel
Nocivo si se inhala
Muy Toxico para organismos acuáticos

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	N. Común	N. científico	Kg/200L	Kg/ha		
Espárrago	Gusano perforador grande de la bellota	*Heliothis virescens*	-	0.20 – 0.25	14	0.01
Palto	Gusano medidor	*Sabulodes aegrotata*	0.05 – 0.075	0.3 - 0.45*	1	0.01

PC: Periodo de carencia LMR: Límite máximo de residuos
*Gasto de agua: 1200 L/Ha

Modo de acción: FREBINE es un insecticida que actúa por contacto e ingestión.

Mecanismo de acción:
FREBINE afecta el equilibrio de iones de calcio independientemente del equilibrio de iones sodio o potasio, lo que provoca la contracción del musculo esquelético de los insectos.

COMPATIBILIDAD
Es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios. En caso de dudas efectuar pruebas de compatibilidad.

PERIODO DE REINGRESO
Se debe reingresar al campo tratado después de transcurridas las 24 horas.

FITOTOXICIDAD
La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos

Número máximo de aplicaciones sucesivas o por cosecha o por campaña o por año:
Puede ser aplicado 1 vez por campaña. El producto debe ser aplicado previa evaluación del campo, cuando se tenga presencia de la plaga, la indicación aplica para los cultivos de palto y esparrago.

Métodos de aplicación:
Agitar el contenido de **FREBINE** en su envase original, luego verter la dosis recomendada en un cilindro conteniendo la mitad de agua limpia. Agitar hasta lograr una mezcla homogénea y luego completar con agua hasta obtener el volumen deseado. La aplicación puede ser realizada con diversos equipos de aplicación terrestre. La absorción de **FREBINE** puede ser mejorada con el uso de un coadyuvante apropiado.

RESPONSABILIDAD CIVIL:
El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

Categoría Toxicológica 4
"LIGERAMENTE PELIGROSO"

ATENCIÓN

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA

160mm

300mm