

17.0 cm

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

THURFEST® 6.4% WP

AGENTE DE CONTROL BIOLÓGICO MICROBIANO

INSECTICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE (WP)

Composición:

Bacillus thuringiensis subespecie *kurstaki* (32,000 IU/mg) 64 g/Kg
Aditivos c.s.p 1 Kg

Registro PQUA N° YYYY-SENASA

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto puede ser mortal si se ingiere.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Durante la manipulación y aplicación, y para ingresar al área tratada de acuerdo al periodo de reentrada (reingreso), use camisa de manga larga, pantalón largo, botas, visor, tapabocas o mascarara y guantes.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.
- Almacenar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado, alejado de alimentos y medicinas para uso humano y veterinario, bajo condiciones que garanticen su conservación.
- El uso inadecuado de este producto causa daños a la salud y al ambiente.
- No almacenar en casas de habitación.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Microorganismos derivados.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrela la etiqueta y/o la Hoja Informativa adjunta.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión no induzca el vómito, acuda inmediatamente a la unidad de salud más cercana. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.

Teléfonos de emergencia:

SAMU: 106 INFOSALUD: 113 PROHASS.: (01) 225-1626

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola.
- Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- En caso de derrame recoger el producto y gestionarlo según lo establecido por las autoridades competentes para este fin.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto, desechos o envases vacíos
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos diez (10) metros.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.

Titular de registro:

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE PALTA HASS DEL PERÚ
Av. Nicolas Arriola Nro. 314 Int. 901 (902) Lima - Lima - La Victoria
Teléfono: (01) 225-1626 | (01) 226-0010

Formulador:

Shanghai Maiheng Chemicals Technology Co. Ltd.
Rm 410, 1398 Jinqiao Rd., Pudong District, Shanghai, China.
Teléfono: 021-50897366 / Fax: 021-50395038

Importador y Distribuidor:
PROHASS



Fecha de Formulación:
N° de Lote:
Contenido neto: **1 Kg**
Fecha de vencimiento:

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- THURFEST® 6.4% WP es un insecticida biológico, formador de esporas, con cristales de proteínas, utilizado para el control de larvas de lepidópteros como *Oiketicus kirbyi*, recomendándose aplicaciones en los primeros estadíos larvales.
- Preparación de la mezcla: Llenar el tanque del equipo aplicador con agua limpia hasta la mitad. En un recipiente aparte mezclar el producto en agua hasta formar una mezcla homogénea, vierta la mezcla al tanque del equipo y complete el volumen de agua a utilizar.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

Cultivo	Plaga		Dosis		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	Kg/ha	Kg/200L		
Palto	Gusano del cesto	<i>Oiketicus kirbyi</i>	-	0.45-0.5	N.A.	N.A.
Palto	Plaga del esparrago	<i>Oxydia vesulia</i>	-	0.4-0.45	N.A.	N.A.
Palto	Gusano medidor	<i>Sabulodes aegrotata</i>	-	0.45	N.A.	N.A.
Palto	Perforador de los frutos	<i>Argyrotaenia sphaleropa</i>	1.00	-	N.A.	N.A.

PC: Periodo de carencia / LMR: Límite máximo de residuos / NA: No aplica

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

- Se recomienda realizar, vía aspersión foliar terrestre, en palto, hasta 2 aplicaciones por campaña, considerando 1 campaña al año, y una frecuencia entre aplicaciones de 10 - 12 días; ante la aparición de los primeros individuos o cuando las condiciones sean favorables para el desarrollo de la plaga.

PERÍODO DE REINGRESO

- No reingresar al campo tratado, sin protección, hasta 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

- THURFEST® 6.4% WP es incompatible con compuestos ácidos y alcalinos fuertes. En caso de dudas sobre la compatibilidad efectuar pruebas en pequeña escala antes de aplicar.

FITOTOXICIDAD

- THURFEST® 6.4% WP no es fitotóxico en los cultivos indicados a las dosis y formas recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

- El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



PRECAUCIÓN



24.0 cm