

FUNGICIDA AGRÍCOLA
Polvo Mojable (WP)

Propineb	700 g/kg
Cymoxanil	60 g/kg
Aditivos	c.s.p. 1kg

Titular de Registro: **GENAGRO S.A.**
Av. Javier Prado Este N°6210, Ofi. 401, La Molina.
Lima - Perú
Teléfonos: (511) 4193030
E-mail.com: info@genagro.com.pe

QINGDAO HISIGMA CHEMICALS CO., LTD.
Room 4307-4309, 3 Building No.6,
Shandong Road,Shinan District, Qingdao City,
Shandong Province, China

Contenido Neto: 1 kg

N° Lote
F. de Form.
F. de Venc.



NO EXPLOSIVO

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE. FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicaciones.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar en lugares frescos y bien ventilados, no almacenar, ni transportar junto con alimentos, medicinas, forrajes y/o semillas.
- Utilice el equipo de protección durante la mezcla, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- No utilice el envase vacío para almacenar bebidas ni alimentos.

- Grupo químico: Acetaminolol y dihidroclorato.
- En caso de **intoxicación**, llevar al paciente inmediatamente al médico y mostrearle la etiqueta.
- Si el paciente vomita, no provocar el vómito, ni dar de beber agua a la persona si esta es inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos, manténgalos abiertos y lávelos con agua limpia durante 15 minutos. Lleve al paciente al oftalmólogo.
- En caso de contacto con la piel, retire la ropa y zapatos y lavar la piel con abundante agua y jabón durante 20 minutos.
- En caso de inhalación retire al paciente a un lugar fresco y aplique respiración artificial si fuera necesario. Lleve al paciente inmediatamente al médico.
- No tiene antídoto, dar tratamiento sintomático.

SAMU: 106
GENAGRO S.A: (01) 419-3030

Y ENVASES VACÍOS.
- Después de usar el contenido, destruya este envase y deposítelo en un lugar destinado para las autoridades locales para este fin.

- Tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos o cualquier cuerpo de agua con los desechos, envases vacíos, restos de aplicación o sobrantes de este producto.
- Respetar una banda de no aplicación a cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- "No aplicar en áreas de recreación".
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames , este producto debe ser recogido inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

KOROSU es un fungicida que combina la acción del propineb con el cymoxanil, por lo cual se logra la inhibición de la respiración celular del patógeno, la inhibición de la síntesis de ADN, ARN y aminoácidos, así como la alteración del metabolismo celular fúngico lo que conlleva a su muerte.

KOROSU se emplea diluido en agua; preparar una pre-mezcla distribuyendo la cantidad necesaria de en un balde, luego vaciar a recipiente definitivo completando la cantidad de agua requerida. Aplicar en pulverizaciones al follaje empleando cualquier equipo convencional terrestre (mochila a palanca, atomizadora, etc) que se encuentre en perfecto estado de funcionamiento y debidamente calibrado.

Se recomienda utilizar el producto cuando se presenta condiciones favorables para el desarrollo del patógeno. Estas condiciones dependerán del historial de campo.

Aplicar sólo una vez por campaña, considerando como máximo 2 campañas por año.

En caso se requiera otra aplicación, rotar con otros productos de diferente modo de acción.

Como máximo aplicar 1kg / ha.

Puede reingresar al campo sin equipo de protección, 24 horas después de aplicado el producto.

KOROSU es compatible con otros plaguicidas de uso común excepto con aquellos de marcada reacción alcalina. En caso de duda, hacer pruebas previas de compatibilidad.

KOROSU no es fitotóxico en el cultivo recomendado, si se aplica a la dosis indicada.

El titular del registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que, es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	Kg/cil 200 L	Kg/ha		
PAPA	"Hielo fungoso, rancha o seca seca "	<i>Phytophthora infestans</i>	0,5	1.0	14	0.1

LMR: Límite Máximo de Residuo

PC:Período de Carença

Medidas en cm.