

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

WeedOut® 15 SL

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE - SL

COMPOSICIÓN:

Glufosinate-ammonium150 g/L

Aditivos: c.s.p. 1 L

Reg. PQUA N° - SENASA

Titular del Registro: PRECISAGRO S.A.C.

Av. Comandante Espinar Nro. 203 Dpto. 4,
(Piso 4), Miraflores, Lima. Tel: 619 1900 / 627 3737.

Formulador: QUÍMICOS Y LUBRICANTES S.A

Anillo Periférico 17-36 zona 11, Guatemala, C.A.
Tel: 502 2474 9300

Importado y Distribuido por: PRECISAGRO S.A.C.

Av. Comandante Espinar Nro. 203 Dpto. 4,
(Piso 4), Miraflores, Lima. Tel: 619 1900 / 627 3737.

Fecha de Formulación:

N° de Lote:

Contenido neto: 500mL

Fecha de vencimiento:

Nocivo en caso de ingestión
Nocivo en contacto con la piel
Nocivo si se inhala

Nocivo para
organismos acuáticos



ATENCIÓN

**"LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA (Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA) ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BIJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**



PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Causa irritación moderada a los ojos.
- Cuidado, evite el contacto, posible teratogénico.
- Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Organofosorado.
- "En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve el paciente al médico y muéstrele copia de esta etiqueta y la Hoja Informativa adjunta"
- No lleve antidoto específico. El tratamiento es sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

SAMU 166
PREGRASO S.A.C. 619 1900 / 627 3737.

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino designado por la autoridad competente, para su gestión.
- Desenviva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Reutilice obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- "Nóvico para organismos acuáticos"
- "No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos".
- "No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto".
- "Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos cinco (05) metros".
- "Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre". "No permitir animales en el área tratada".
- "El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva".
- "En caso de derrames, el producto debe ser recolectado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas"

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	MALEZAS		DOSIS		P.C. (litro)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	L/CI	L/A		
Vid	Gramma china	<i>Sorghum halepense</i>	-	2,0 – 2,5	14	0,15
	Lechera	<i>Euphorbia hirta</i>				
	Ventolapa	<i>Portulaca olerace</i>				
	Pala gallina	<i>Eliusine indica</i>				
	Coquillo	<i>Cyperus rotundus</i>				
Palma aceitera	Remolina	<i>Paspalum virgatum</i>	2,0 – 2,5	-	14	0,03
	Kurzu	<i>Pueraria phaseoloides</i>				
	Siempre viva	<i>Commelina diffusa</i>				
	Coquillo	<i>Cyperus efformis</i>				
	Pala de gallina	<i>Eliusine indica</i>				
Yuyo	<i>Amaranthus hybridus</i>					

P.C. Período de Carencia

LMR. Límite Máximo de Residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

- La aplicación es en postemergencia de la maleza y debe dirigirse a la maleza en pleno crecimiento vegetativo y cuando tenga de 15 a 20 cm de tamaño con suficiente follaje
- Aplicar en las primeras horas de la mañana
- No aplicar Veed Out a plantas estresadas o temperaturas extremas
- Como máximo dos aplicación (con un intervalo de 30 días para vid y entre 30 a 45 días para palma aceitera) por campaña/año.

PERÍODO DE REINGRESO

No reingresar sin protección a un campo aplicado hasta 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

Es compatible con la gran mayoría de los plaguicidas Es conveniente antes de realizar cualquier mezcla, efectuar pruebas de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrán ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar solo la dosis señalada en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las señaladas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

**CATEGORIA TOXICOLÓGICA 4
LIGERAMENTE PELIGROSO.**

