

28 cm

15 cm

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es dañino. No ingerir.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Utilizar ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: Avermectin + Neonicotinoide.
- No existe antidoto específico. El tratamiento es sintomático.
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y mostrar la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por los menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.

TELEFONOS DE EMERGENCIA:  
SAMU: 106  
SHARDA PERU SAC: 222 - 2695

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Tóxico para abejas u artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración.
- No aplicar en presencia de polinizadores.
- No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o en cultivos aledaños.
- Aplicar temprano en las mañanas o muy en las tardes. Evitar la deriva por el viento.
- Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

MIRLO®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

ACARICIDA - NEMATICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Composición:

Abamectin.....36 g/L  
Thiamethoxam.....72 g/L  
Aditivos .c.s.p.....1 L

Reg. PQUA N° 3742 - SENASA

Titular del Registro:  
SHARDA PERU S.A.C  
Calle Las Castañitas 138  
Urb. El Palomar, San Isidro  
Teléfono: 222-2695

Importado y distribuido por:  
SANIVEG PERU S.A.C  
Av. San Jenaro 235  
Urb. Industrial, Puente Piedra  
Teléfono: 637 - 1269

Formulado por:  
SHARDA CROP CHEM LIMITED  
CHINA OFFICE  
Room 1803, B Zone, Yunting  
building, No. 216 Qingguoxiang,  
Changzhou, Jiangsu, CHINA.  
Telf: 0519-88172050



Contenido Neto: 1 L

Lote N°:  
Fecha de Form.:  
Fecha de Venc.:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO  
DAÑINO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

MIRLO formado por dos ingredientes activos: Abamectin que inhibe la transmisión neuromuscular de los insectos, llevándolos a la parálisis muscular y una consecuente muerte. Thiamethoxam que actúa dañando el sistema nervioso del insecto conduciéndolo a la muerte.

Aplicar MIRLO con equipos convencionales. Para la preparación de la mezcla, llene el cilindro o tanque de aplicación con agua limpia hasta la mitad y luego el producto revolviendo constantemente. Completar luego hasta el volumen deseado.

“CONSULTE A UN INGENIERO AGRÓNOMO”

| CULTIVO   | PLAGA                          |                                | DOSIS<br>L/ha | P.C.<br>(días) | L.M.R.<br>(ppm)                        |
|-----------|--------------------------------|--------------------------------|---------------|----------------|----------------------------------------|
|           | Nombre Común                   | Nombre Técnico                 |               |                |                                        |
| Mandarina | “Acaro del tostado”            | <i>Phyllocoptruta oleivora</i> | 0.125         | 28             | 0.02 <sup>a</sup><br>0.4 <sup>b</sup>  |
| Cebolla   | “Nematodo del nudo de la raíz” | <i>Meloidogyne incognita</i>   | 2.0           | 30             | 0.01 <sup>a</sup><br>0.01 <sup>b</sup> |
| Vid       | “Nematodo del nudo de la raíz” | <i>Meloidogyne incognita</i>   | 2.0           | 21             | 0.01 <sup>a</sup><br>0.7 <sup>b</sup>  |

L.M.R. = Límite máximo de residuos  
a: Abamectin, b: Thiamethoxam

PC = Periodo de carencia

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:

MIRLO se debe aplicar cuando se observen los primeros daños del insecto. Para el cultivo de mandarina, realizar un máximo de 2 aplicaciones por campaña, con un intervalo de 15 días.

Para los cultivos de cebolla y vid, realizar 1 aplicación por campaña, con una campaña al año, las aplicaciones se deben realizar vía drench o sistema de riego, con el suelo en capacidad de campo.

Se recomienda rotar con productos de diferentes modos de acción.

PERIODO DE REINGRESO: No reingresar sin protección a un campo aplicado hasta después de 24 horas después de la aplicación. Mantener alejado al ganado durante este período.

COMPATIBILIDAD:

MIRLO es compatible con la mayoría de fitosanitarios de uso común. Se recomienda, antes de efectuar una mezcla, realizar una prueba de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD:

MIRLO no ha mostrado síntomas de fitotoxicidad luego de ser aplicado a la dosis recomendada.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

