

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ADJUNTA
ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de CUIDADO. No ingerir.
- No comer, no beber, ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilice ropa protectora, guantes, botas, gafas y mascarilla durante el manipuleo y aplicación y para re-ingresar al área tratada en las primeras 12 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento en horas de baja insolación y viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Diamida y Benzoilureas
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al centro médico y muestre la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir el vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- No existe antídoto específico. Tratamiento sintomático.
- Teléfonos de emergencia:
SAMU 106; Adama Agriculture Perú S.A.: (01) 641-0000.

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y DE ENVASES VACÍOS:

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



RAVARI[®] SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Composición:
Chlorantraniliprole..... 150 g/L
Novaluron..... 131 g/L
Aditivos c.s.p. 1 Litro

Reg. PQUA N° XXXX-SENASA

Titular del Registro,
Importador y Distribuidor:
ADAMA Agriculture Perú S.A.
Av. El Derby N° 254 Of. 306.
Santiago de Surco. Lima - Perú.
Teléfono: (01) 641-0000

Formulador:
ADAMA Makhteshim Ltd.
Northern Industrial Zone
P.O. Box 60 Be'er-Sheva 8410001.
Israel.

Contenido neto: **500 ml**
Lote No.

Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

Nocivo en caso de ingestión.
Nocivo en contacto con la piel
Nocivo si se inhala
Muy tóxico para organismos acuáticos



ADAMA



PELIGRO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

RAVARI SC es un insecticida de movimiento sistémico y translaminar que actúa por ingestión, posee dos ingredientes activos: **chlorantraniliprole** que promueve la activación no regulada de los canales receptores de ryanodina que afectan la regulación de la contracción muscular y **novaluron** que actúa inhibiendo la formación de quitina.

RAVARI SC se aplica al follaje con equipo de pulverización terrestre, boquillas de gota fina y uniforme. Previo a la aplicación asegurarse que el equipo se encuentre en buenas condiciones de uso y correctamente calibrado. Agitar bien el envase antes de abrir.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	PC (días)	LMR (ppm)
		(L/200L)		
Arándano	Gusano perforador (<i>Chloridea virescens</i>)	0.15 - 0.2	14	2.5/7.0 ²
Espárrago	Gusano perforador (<i>Chloridea virescens</i>)	0.15 - 0.2	21	13/0.01 ²
Maíz	Cogollero (<i>Spodoptera frugiperda</i>)	0.14 - 0.15	7	0.01/0.05 ²
Pimiento	Gusano perforador (<i>Chloridea virescens</i>)	0.15 - 0.2	7	0.6/0.7 ²

P.C.: Período de Carenia LMR: Límite Máximo de Residuos

(1) Chlorantraniliprole / (2) Novaluron

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se recomiendan dos (02) aplicaciones por campaña considerando una (01) campaña/año para pimiento y dos (02) campañas/año para arándano, espárrago y maíz. En los cultivos de arándano, espárrago y maíz, se recomienda un intervalo mínimo de 10 días entre aplicaciones, para pimiento un intervalo mínimo de 14 días.

Para mayor información ver hoja informativa adjunta.

PERÍODO DE REINGRESO, COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD

Ver Hoja Informativa adjunta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4
LIGERAMENTE PELIGROSO



Dimensiones reales : 230 mm x 120 mm

Esta etiqueta va acompañada de Hoja Informativa