

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

# RAVARI<sup>®</sup> SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA  
INSECTICIDA AGRÍCOLA  
SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Reg. PQUA N° XXXX-SENASA

Composición:  
Chlorantraniliprole..... 150 g/L  
Novaluron..... 131 g/L  
Aditivos ..... c.s.p. 1 Litro

Titular del Registro, Importador y Distribuidor:  
**ADAMA Agriculture Perú S.A.**  
Av. El Derby N° 254 Of. 306.  
Santiago de Surco. Lima - Perú.  
Teléfono: (01)641-0000

Formulador:  
**ADAMA Makhteshim Ltd.**  
Northern Industrial Zone  
P.O. Box 60 Be'er-Sheva 8410001. Israel.

Contenido neto: **5 Litros**  
Lote No.  
Fecha de Formulación:  
Fecha de Vencimiento:

**Nocivo en caso de ingestión**  
**Nocivo en contacto con la piel**  
**Nocivo si se inhala**  
**Muy tóxico para organismos acuáticos**

  
**ADAMA**

  
**PELIGRO**

Cara

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Este producto es de CUIDADO. No ingerir.
- No comer, no beber, ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilice ropa protectora, guantes, botas, gafas y mascarilla durante el manipuleo y aplicación y para re-ingresar al área tratada en las primeras 12 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo químico: Diamida y Benzotilureas.
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al centro médico y muestre la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir el vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- No existe antídoto específico. Tratamiento sintomático.
- Teléfonos de emergencia:  
SAMU 106; Adama Agriculture Perú S.A.: (01)641-0000.

**CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilicelo, triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**

- En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**  
RAVARI SC es un insecticida de movimiento sistémico y transláminar que actúa por ingestión, posee dos ingredientes activos: chlorantraniliprole que promueve la activación no regulada de los canales receptores de ryanodina que afectan la regulación de la contracción muscular y novaluron que actúa inhibiendo la formación de quitina.

RAVARI SC se aplica al follaje con equipo de pulverización terrestre, boquillas de gota fina y uniforme. Previo a la aplicación asegurarse que el equipo se encuentre en buenas condiciones de uso y correctamente calibrado. Agitar bien el envase antes de abrir.

**CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO**

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	PC	LMR
		(L/200L)	(días)	(ppm)
Arándano	Gusano perforador ( <i>Chloridea virescens</i> )	0.15 - 0.2	14	2.5/7.0 <sup>2</sup>
Espárrago	Gusano perforador ( <i>Chloridea virescens</i> )	0.15 - 0.2	21	13 <sup>1</sup> /0.01 <sup>2</sup>
Maíz	Cogollero ( <i>Spodoptera frugiperda</i> )	0.14 - 0.15	7	0.01 <sup>1</sup> /0.05 <sup>2</sup>
Pimiento	Gusano perforador ( <i>Chloridea virescens</i> )	0.15 - 0.2	7	0.6 <sup>1</sup> /0.7 <sup>2</sup>

P.C.: Período de Carencia LMR: Límite Máximo de Residuos  
(1) Chlorantraniliprole / (2) Novaluron

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**  
Se recomiendan dos (02) aplicaciones por campaña considerando una (01) campaña/año para pimiento y dos (02) campañas/año para arándano, espárrago y maíz. En los cultivos de arándano, espárrago y maíz, se recomienda un intervalo mínimo de 10 días entre aplicaciones, para pimiento un intervalo mínimo de 14 días..

Momento de aplicación recomendado:  
Ver la Hoja informativa adjunta.

**PERIODO DE REINGRESO, COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD**  
Ver la Hoja informativa adjunta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**  
El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4**  
**LIGERAMENTE PELIGROSO**



Contracara

Dimensiones: 150 mm x 140 mm  
Esta etiqueta va acompañada de Hoja Informativa