

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de CUIDADO. No ingerir.
- No comer, no beber, ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilice ropa protectora, guantes, botas, gafas y mascarilla durante el manejo y aplicación y para re-ingresar al área tratada en las primeras 12 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento en horas de baja insolación y viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Diamida y Benzoilureas
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al centro médico y mostrar la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir el vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- No existe antídoto específico. Tratamiento sintomático.
- Teléfonos de emergencia:
SAMU 106; Adama Agriculture Perú S.A.: (01) 641-0000.

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.



RAVARI[®]sc

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Composición:

Chlorantraniliprole..... 150 g/L

Novaluron..... 131 g/L

Aditivos c.s.p. 1 Litro

Reg. PQUA N° XXXX-SENASA

Titular del Registro, Importador y

Distribuidor:

ADAMA Agriculture Peru S.A.

Av. El Derby N° 254 Of. 306

Santiago de Surco. Lima - Perú.

Teléfono: (01) 641-0000

Formulador:

ADAMA Makhteshim Ltd.

Northern Industrial Zone

P.O. Box 60 Be'er-Sheva 8410001.

Israel.

Contenido neto: 200 Litros

Lote No.

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

Nocivo en caso de ingestión

Nocivo en contacto con la piel

Nocivo si se inhala

Muy tóxico para organismos acuáticos



ADAMA

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

RAVARI SC es un insecticida de movimiento sistémico y translaminar que actúa por ingestión, posee dos ingredientes activos: **chlorantraniliprole** que promueve la activación no regulada de los canales receptores de ryanodina que afectan la regulación de la contracción muscular y **novaluron** que actúa inhibiendo la formación de quitina.

RAVARI SC se aplica al follaje con equipo de pulverización terrestre, boquillas de gota fina y uniforme. Previo a la aplicación asegurarse que el equipo se encuentre en buenas condiciones de uso y correctamente calibrado. Agitar bien el envase antes de abrir.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	PLAGA	DOSIS (L/200L)	PC (días)	LMR (ppm)
Arándano	Gusano perforador (<i>Chloridea virescens</i>)	0.15 - 0.2	14	2.5'/7.0²
Espárrago	Gusano perforador (<i>Chloridea virescens</i>)	0.15 - 0.2	21	13'/0.01²
Maíz	Cogollero (<i>Spodoptera frugiperda</i>)	0.14 - 0.15	7	0.01'/0.05²
Pimiento	Gusano perforador (<i>Chloridea virescens</i>)	0.15 - 0.2	7	0.6'/0.7²

P.C.: Período de Carencia LMR : Límite Máximo de Residuos (1)Chlorantraniliprole / (2) Novaluron

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se recomiendan dos (02) aplicaciones por campaña considerando una (01) campaña/año para pimiento y dos (02) campañas/año para arándano, espárrago y maíz. En los cultivos de arándano, espárrago y maíz, se recomienda un intervalo mínimo de 10 días entre aplicaciones, para pimiento un intervalo mínimo de 14 días.

Momento de aplicación recomendado:

- **Arándano:** Desde la etapa de desarrollo vegetativo (brotamiento en adelante).
- **Espárrago:** Desde la etapa de desarrollo vegetativo (apertura de filocladios en adelante).
- **Maíz:** Desde la etapa de crecimiento o desarrollo inicial del cultivo (14 días después de sembrado) hasta la etapa de crecimiento lento.
- **Pimiento:** Desde la etapa de desarrollo vegetativo (brotamiento en adelante).

Rotar con otros productos de diferente mecanismo de acción a fin de evitar la resistencia.

PERIODO DE REINGRESO

Se podrá ingresar al campo sin ropa de protección después de 12 horas de aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD

No mezclar con plaguicidas de fuerte reacción alcalina o ácida. En caso de mezcla con otros productos, se recomienda realizar previamente una prueba de compatibilidad física.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico en los cultivos y dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4
LIGERAMENTE PELIGROSO



PELIGRO



Dimensiones: 330 mm x 200 mm