

# GOLDEN GLULIER<sup>200 SC</sup>

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**HERBICIDA AGRÍCOLA**

**CONCENTRADO SOLUBLE (SL)**

**Composición:**

L-Glufosinate ammonium\* .....200 g/L

\*(Forma sal de amonio de L-glufosinate o glufosinate-P)

Aditivos .....c.s.p. 1 L

**Reg. PQUA N° - SENASA**

**Titular del registro: FARBIC CONSULTORES S.A.C.**

**Formulador:**



**LIER CROPSCIENCE CO., LTD.**

No. 329 South Mianzhou Avenue, Mianyang, Sichuan, P. R. China  
Email: market@lierchem.com  
Teléfono: +86-8162841584

**Importador:**



**FARBIC CONSULTORES S.A.C.**

Av. Emilio Cavenecia 225 Oficina 409, San Isidro, Lima – Perú  
Teléfono +51 983275666

Fecha de Formulación:

N° de Lote:

**Contenido Neto: 100 ml, 200 ml, 250 ml y 500 ml**

Fecha de Vencimiento:

**NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN**

**NOCIVO EN CONTACTO CON LA PIEL**

**NOCIVO SI SE INHALA**



**ATENCIÓN**



**LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO**  
**"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Cuidado, evite el contacto, posible teratogénico.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Durante la manipulación y aplicación, y para ingresar al área tratada de acuerdo al período de reentrada (12 horas), use camisa de manga larga, pantalón largo, botas, visor, tapa boca o máscara y guantes.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada por separada y báñese con abundante agua y jabón.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Mantener el producto en el envase original, etiquetado y cerrado, alejado de alimentos, medicinas para uso humano y veterinario, bajo condiciones que garanticen su conservación.
- El uso inadecuado de este producto causa daños a la salud y al ambiente.
- No almacenar en casa de habitación.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo Químico: Herbicida organofosforado
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y mostrar la etiqueta. No use solo al intoxicado.
- ANTÍDOTO: No existe antídoto específico. Administrar tratamiento sintomático.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA**

- S.A.C. 06
- EMERGENCIAS: 113
- Titular del registro S.A.C. +51 983275666



**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

Cultivo	Maleza		Dosis (L/ha)	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Vid	"Verdolaga"	Portulaca oleraceae	0.6	7	0.15
	"Coquito"	Cynopus rotundus			
	"Amor seco"	Amaranthus pilosa			
	"Yuyo"	Amaranthus viridis			
	"Gramma china"	Sorghum habelense			

L.M.R.: Límite máximo de residuos (ppm: partes por millón)

P.C.: Período de carencia (días)

**FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:**

Aplicar una vez por campaña de cultivo como máximo. Considerando una campaña por año para el cultivo de vid. Se recomienda hacer las aplicaciones a primeras horas de la mañana y por la tarde.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4:**  
**LIGERAMENTE PELIGROSO**