

$1,0 \pm 0,3$ $1,0 \pm 0,3$

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**
- Evite el contacto con la piel y la ropa, así como ingerir el producto o la aspiración.
 - Utilice el equipo de protección durante la mezcla, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas.
 - No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
 - Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
 - Después de usar el producto, cambíese, lave la ropa usada y báñese con abundante agua y jabón.
 - Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado, en un lugar seco y con buena ventilación.
 - No almacenar ni transportar con alimentos, medicinas, bebidas o forrajes.
 - No utilizar el envase vacío para almacenar bebidas ni alimentos.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**
- **Grupo químico: Imidazoles**
 - En caso de intoxicación o ingestión, lleve al paciente inmediatamente al médico y muéstrela etiqueta.
 - En caso de ingestión, enjuague la boca con agua si está consciente. No provoque el vómito.
 - En caso de contacto con los ojos, lávelos inmediatamente con agua limpia durante 15 minutos.
 - En caso de contacto, quítese la ropa y lave la piel con abundante agua jabón.
 - En caso de inhalación retire al paciente a un lugar fresco y aplique respiración artificial si fuera necesario.
 - Antídoto: No tiene. dar tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
SAMU: 106 NUTRITEC COMPANI S.A.C: (01) 3246534

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego utilícelo tratando de no perforarlo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
 - Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- **Alimentar peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semi-acuáticas.**
- **No aplicar en zonas con napas freáticas superficiales ni en suelos altamente permeables.**
- **No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.**
- **Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos 10 metros.**
- **Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir que animales en el área tratada.**
- **Evitar que niños empleen los productos para consumo humano.**
- **En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.**



PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA
CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

Composición:

Prochloraz	450 g/L
Aditivos	c.s.p. 1L

Reg. PQUA N° 3992 - SENASA

TITULAR DE REGISTRO, IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR:
NUTRITEC COMPANI S.A.C.
 Av. Las Torres N° 489-491, Ate
 Lima - Perú. Cell: 983 481 769
www.nutritec.biz

FABRICADO Y FORMULADO POR:
Qingdao Agro-unitek Cropscience Co., Ltd.
Dirección: Room 304, Haier road N° 63,
Qingdao City, Shandong, China

Contenido Neto: **200L**

Lote N°.
F. de Form. :
F. de Venc. :

NO CORROSIVO NO INFLAMMABLE NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

STRAX es un fungicida que actúa por contacto y de acción translaminar. Se considera de acción protectante y erradicante. Como mecanismo de acción actúa inhibiendo la biosíntesis del ergosterol produciendo el deterioro del crecimiento y posterior muerte del hongo.

STRAX se aplica en aspersión con equipos de aspersión terrestre, previa mezcla con agua. Preparar una premezcla de acuerdo a la dosis indicada con la mitad de volumen del agua a utilizar, agitar hasta que el producto este bien disuelto y completar el volumen de la aplicación. Calibrar el equipo previamente. Aplicar en cultivos debidamente hidratados con suelos en capacidad de campo. Usar preferentemente agua con pH 6 a 6,5.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS	P.C. (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	%		
PALTO	"Muerte regresiva"	<i>Lasiodiplodia theobromae</i>	0.1	14	7

P.C.: Periodo de Carenzia

LMR: Límite Máximo de Residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

- Aplicar previa evaluación de la plaga y de las condiciones óptimas de su desarrollo.
- Como máximo 1 aplicación / campaña / año.
- Dosis máxima: 0.86 L/ha.
- De persistir la plaga, usar otro fungicida de diferente mecanismo de acción para evitar la resistencia

PERIODO DE REINGRESO

PERIODO DE REINGRESO
Se puede reingresar al campo con equipo de protección durante las primeras 12 horas de aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD

COMPATIBILIDAD: El producto es incompatible con agentes oxidantes, ácidos y álcalis. Antes de efectuar las mezclas, se recomienda hacer pruebas de compatibilidad con el plaguicida que se desea aplicar.

FITOTOXICIDAD

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

Medidas en cm.

Envase: PEAD