




LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

Este producto es de uso agrícola. No ingerir.
El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicaciones.
No comer el producto ni el envase original, bien lavado y enjuagado.
Almacenar en lugares frescos y bien ventilados, no almacenar ni transportar junto con alimentos, medicinas, alimentos para animales.
Utilice el equipo de protección durante la mezcla, aplicación y para ingresar al área donde se aplicó el producto.
Después de usar el producto, lávese la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
No utilizar el envase vacío para almacenar bebidas ni alimentos.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

Grupo químico: Antifúngico y fitoprotector.
En caso de ingestión, lavar el estómago inmediatamente al médico y consultar la etiqueta.
En caso de ingestión, no provocar el vómito, ni dar de beber agua a la persona si está inconsciente.
En caso de contacto con los ojos, mantenerlos abiertos y lavarlos con agua limpia durante 10 minutos. Llevar al paciente al médico.
En caso de contacto con la piel, lavar la ropa y lavar la piel con abundante agua y jabón durante 20 minutos.
En caso de inhalación, retirar al paciente a un lugar fresco y aplicar respiración artificial si fuera necesario. Llevar al paciente inmediatamente al médico.
No hacer esfuerzos, dar tratamiento sintomático.

TELEFONOS DE EMERGENCIA
SAMU: 105 / INHAS S.A.C.: 959168770

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido, destruya este envase y deposítelo en un lugar designado para los residuos agrícolas peligrosos.

RIESGOS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

No contaminar ríos, lagos, embalses, arroyos o cualquier cuerpo de agua. Los desechos, envases vacíos, restos de aplicación o sobornos de este producto, deben ser tratados como residuos agrícolas peligrosos.
Respetar una banda de aplicación o cuarenta de agua de al menos 10 metros.
Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir que entren al área tratada.
El producto no debe aplicarse en zonas con raras especies de plantas o en suelos adyacentes a parques.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

CYMOPROB es un fungicida que combina la acción del propineb y cymoxanil, por lo que actúa como inhibidor de la respiración celular del patógeno. La mezcla de ambos es una ADH, ADH y amoníaco, así como la adición del metadato para reducir los que causan la enfermedad.

CYMOPROB se emplea diluido en agua preparada una mezcla, distribuyendo la cantidad necesaria de un bote, luego vaciar el bote, distribuyendo la cantidad de agua requerida. Aplicar en pulverización en folio, regando cualquier especie convencional sembrada (lechuga, papa, ajo, cebolla, etc.). Que se encuentre en perfecto estado de funcionamiento y funcionamiento correcto.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se recomienda utilizar el producto cuando las condiciones favorables para el desarrollo del hongo. Estas condiciones dependen del tipo de cultivo.
Aplicar una vez por semana, o cuando las condiciones de cultivo o temperatura sean adecuadas.

PERIODO DE REINGRESO

Puede reingresar al cultivo en un grupo de protección, 24 horas después de aplicar el producto.

COMPATIBILIDAD

CYMOPROB es compatible con otros plaguicidas de uso común excepto con aquellos de modo de acción sistémica. En caso de duda, hacer pruebas previas de compatibilidad.

PRECAUCIONES

El producto no debe aplicarse en cultivos no recomendados, ni se aplica a la dosis indicada.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El usuario se responsabiliza de que las características físicas y químicas del producto contenido en esta envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que, en efecto, para los fines recomendados, a la vez que el manejo de acuerdo con las condiciones e instrucciones indicadas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	Kg/ha 200 L	Kg/ha		
PAPA	"Halo" (Halo)	Phytophthora infestans	0.5	1.0	14	0.1

PC: Período de Cerezo LMR: Límite Máximo de Residuos

23±0,5