



Cymoprob
 PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA
FUNGICIDA AGRÍCOLA

Polvo Mojable (WP)

Composición:
 Propineb 700 g/kg
 Cymoxanil 60 g/kg
 Aditivos c.s.p. 1kg

Registro PQUA N° 3993 - SENASA

TITULAR DE REGISTRO, IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR:
 NUTRITEC COMPANI S.A.C.
 Av. Las Torres N° 465-491, Ate
 Lima - Perú, Cell.: 983 481 269
 www.nutritec.biz

FABRICADO Y FORMULADO POR:
 Qingdao Agronomic Pesticides Co., Ltd.
 Dirección: Room 301, Hai'er Road N° 63,
 Qingdao City, Shandong, China

Contenido Neto: 500 g
 Lote N°:
 F. de Form. :
 F. de Venc. :

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
 CUIDADO**



LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO "MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de uso agrícola, no ingerir.
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- Evitar el fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Consultar el producto de otro modo original, descrito en el etiquetado.
- Mantener en lugares frescos y bien ventilados; no almacenar ni transportar junto con alimentos, bebidas, forraje para animales.
- Utilice el equipo de protección durante la mezcla, aplicación y para limpiar el área de trabajo en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto, límbese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua jabonosa.
- No utilizar el mismo agua para almacenar bebidas ni alimentos.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de inhalación: Lave abundantemente el medio y muevale la cabeza.
- En caso de ingestión, no provoque el vómito, ni dar de beber agua a la persona si está inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos, manténgalos abiertos y lávelos con agua limpia durante 15 minutos. Lave el párpado internamente.
- En caso de contacto con la piel: retire el ropaje y lávela la parte contaminada que sea posible durante 20 minutos.
- En caso de contacto con la piel: retire el ropaje y aplique nebulización abundante si fuera necesario. Lave el paciente abundantemente al médico.
- No lave heridas, que se manchen o abrasionen.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
 SANJL: LOS NUTRITEC COMPANI S.A.C. (01) 3346534

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y RESIDUOS:

- Después de usar el contenido, desahogue este envase y deposítelo en un lugar seguro para los animales domésticos.

REQUISITOS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

- No contamine ríos, lagos, esteros, arroyos o cualquier otro cuerpo de agua.
- Reservar un fondo de condicionamiento de agua de 10 cm.
- Proteger para los animales domésticos, fauna y flora silvestre, no permitir animales en el área de trabajo.
- El producto no debe aplicarse en zonas con cultivos, superficies o en suelos de interés ambiental.
- El envase dañado, este producto usado, no almacenarlo y depositarlo en un lugar seguro a fin de evitar su ingreso a los cursos de agua.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

CYMOPROB es un fungicida que contiene la acción del producto **CYMO** al cymoxanil, por lo que tiene la distribución de la resistencia natural del **CYMO**. Al respecto de la resistencia ADM, AMR y amoxicilina, así como la alternancia con **PHYTO** para controlar hongos lo que cambia sus marcas.

CYMOPROB es un polvo diluido en agua de uso agrícola, distribuido en la cantidad necesaria de un botellero. Luego aplicar el producto en el cultivo con la cantidad de agua requerida. Aplicar en pulso, en forma de nebulización, evitando cualquier equipo mecánico que pueda generar ruido (trilladora, cosechadora, etc.) que se encuentre en perfecto estado de funcionamiento y que no esté contaminado.

FRECUENCIA Y EPOCA DE USO:

Se recomienda utilizar el producto **CYMO** en las mejores condiciones favorables para el desarrollo del cultivo. Se debe considerar los períodos del cultivo de campo.

Aplicar solo una vez por cultivo, considerando como máximo 2 aplicaciones por año. En caso de requerir una aplicación, iniciar con otros productos de diferente modo de acción. Como se muestra en el gráfico.

PERIODO DE PROTECCIÓN:

Para el cultivo de campo sin equipo de protección, 24 horas después de aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD:

CYMOPROB es compatible con otros plaguicidas de uso común excepto con aquellos de modo de acción acaricida. En caso de duda, hacer pruebas previas de compatibilidad. Como se muestra en el gráfico.

TOXICIDAD:

CYMOPROB es tóxico en el cultivo recomendado, se aplica a la dosis indicada.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular del registro garantiza que los datos técnicos, factuales y de uso del producto contenido en esta etiqueta corresponden a los anotados en la etiqueta y que, de efecto para los fines recomendados, se usará y manejará de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO*

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO	Kg/ha 200 L	Kg/ha		
PAPA	Mancha anaranjada, manchado o seca seca	Phytophthora infestans	0,5	1,0	14	0,1

PC: Intervalo de Protección
 LMR: Límite Máximo de Residuos