

50 cm

25 ± 0,5

25 ± 0,5

Cymoprob

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA FUNGICIDA AGRÍCOLA Polvo Mojable (WP)

Composición:
 Propineb 700 g/kg
 Cymoxanil 60 g/kg
 Aditivos c.s.p. 1kg

Registro PQUA N° 3992 - SENASA

TITULAR DE REGISTRO, IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR:
NUTRITEC COMPANI S.A.C.
 Av. Las Torres N° 489-491, Ate
 Lima - Perú. Cell.: 983 481 769
 www.nutritec.biz



FABRICADO Y FORMULADO POR:
Qingdao Agro-unitek Cropscience Co., Ltd.
 Dirección: Room 304, Hai'er road N° 63,
 Qingdao City, Shandong, China

Contenido Neto: 1 Kg

Lote N° :
 Fecha de Form. :
 Fecha de Venc. :

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO "MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto de uso agrícola no ingerir.
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicaciones.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar en lugares frescos y bien ventilados, no almacenar, ni transportar junto con alimentos, medicinas, forrajes y/o semillas.
- Utilice el equipo de protección durante la mezcla, aplicación y para regresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto, cambíese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- No utilizar el envase vacío para almacenar bebidas ni alimentos.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Azoles y difenilcarbamato.
- En caso de intoxicación, lleve al paciente inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de ingestión, no provoque el vómito, ni dar de beber agua a la persona si está inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos, manténgalos abiertos y lávelos con agua limpia durante 15 minutos. Lleve al paciente al oftalmólogo.
- En caso de contacto con la piel, retire la ropa y zapatos y lavar la piel con abundante agua y jabón durante 20 minutos.
- En caso de inhalación retire al paciente a un lugar fresco y aplique respiración artificial si fuera necesario. Lleve al paciente inmediatamente al médico.
- No tiene antídoto, dar tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
 SAMU: 106 NUTRITEC COMPANI S.A.C.: 983 481 769

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, destruya el envase y deposítelo en un lugar designado para las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar riego, estanques, arroyos o cualquier cuerpo de agua con los desechos, envases vacíos, restos de aplicación o sobantes de este producto.
- Respetar un baño de 27 aplicación a cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. "No permitir que los animales entren en el área tratada".
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, este producto debe ser recogido inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su infiltración hacia aguas subterráneas.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

CYMOPROB es un fungicida que somatiza la acción del propineb con el cymoxanil, por lo cual se logra la inhibición de la reproducción celular del patógeno, la inhibición de la síntesis de ADN, ARN, aminoácidos, así como la alteración del metabolismo celular, lo que conlleva a su muerte.

CYMOPROB se mezcla diluido en agua, preparar una emulsión, distribuyendo la cantidad necesaria de en un litro, luego vaciar al recipiente definitivo completando la cantidad de agua requerida. Aplicar en pulverizaciones al follaje expuesto, utilizar equipo convencional terrestre (mochila a palanca, atomizador, etc) que se encuentre en perfecto estado de funcionamiento y debidamente calibrado.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se recomienda utilizar el producto cuando no se presenta condiciones favorables para el desarrollo del patógeno. Estas condiciones dependerán del historial de cultivos.

Aplicar solo una vez por campaña, considerando como máximo 2 campañas por año.

En caso de ser necesario otra aplicación, rotar con otros productos de diferente grupo químico.

Como máximo aplicar 1 kg/ha.

PERIODO DE REINGRESO

Reingresar al campo sin equipo de protección, 24 horas después de aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD

CYMOPROB es compatible con otros plaguicidas de uso común con aquellos de marcada reacción alcalina. En caso de duda, hacer pruebas previas de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD:

CYMOPROB no es fitotóxico en el cultivo recomendado, si se aplica a las dosis indicadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	Kg/ha	g/ha		
PAPA	Hongo fungoso, mancha o seca seca	<i>Phytophthora infestans</i>	0,5	1,0	14	0,1

LMR: Límite Máximo de Residuos

PC: Período de Carenia



Medidas en cm.