

**"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"  
MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Este producto es de CUIDADO, no ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar aspersión.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar el área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- Evite almacenar por encima de los 35° C.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo Químico: Phthalimide + Morpholine
- En caso de Intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y mostrar la etiqueta.
  - En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona esta inconsciente o padece convulsiones.
  - En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos
  - En caso con contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado, Bañarse con abundante agua y jabón.
  - En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado.
  - Brindar respiración artificial si fuera necesario.
  - Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático y de soporte.
  - Teléfonos de Emergencia
  - CICOTOX: 0801-13040 (línea gratuita)
  - ESSALUD: 0801-10200 (línea gratuita)
- MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS**
- Después de usar el contenido del envase inutilicelo triturandolo o perforandolo y deposítelos en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
  - Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
  - Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE**

- \*Peligroso para organismos acuáticos\*.
- \*No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos\*.
- \*No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación\*.
- \*Respetar la banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros\*.
- \*Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada\*.
- \*El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables\*.
- \*En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas\*.



# FOLTEK

**PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRICOLA**

**FUNGICIDA AGRICOLA**

**POLVO MOJABLE - WP**

**COMPOSICIÓN**

Folpet..... 600 gr/kg  
Dimethomorph..... 125 gr/kg  
Aditivos ..... C.S.P. 1.0 Kg.

**Reg. N° PQUA - 1547 SENASA**

**Titular del Registro Importador:**

**nutritec**  
Compani SAC

Cell.: 990 701 124  
[www.nutritec.biz](http://www.nutritec.biz)  
Jr. Santiago Crespo 421  
San Luis - Lima - Perú

**FORMULADO POR:**

**Nanjing Essence Fine Chemical Co., LTD.- China**  
**9th Floor, N° 58, Nanhu Road, Nanjing. China**

**CONTENIDO NETO:**

**500gr**

LOTE N°:  
FECHA DE FORMULACIÓN:  
FECHA DE VENCIMIENTO :

**NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

FOLTEK es un fungicida preventivo y curativo, actúa por contacto, sistémico y translaminar, inhibe la germinación de las esporas, formación de las paredes celular e inactivación de los diversos sistemas enzimáticos, involucrados en el metabolismo de los hongos.

La preparación de la mezcla de FOLTEK, se realiza diluyendo la dosis indicada en un recipiente previo con agua, luego esta solución se vierte en un cilindro o mochila de aplicación y se completa con agua hasta llegar el volumen requerido. Se agita y se procesa a la aplicación.

Se recomienda usar agua limpia y acondicionar utilizando un regulador de acidez. pH óptimo: 6.5 (ligeramente ácido)

**CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO**

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P. C. L/Ha	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	Kg/Ha	Kg/CIL		
PAPA	Rancha o Hielo	<i>Phytophthora infestans</i>	1.0		10	*0.05 **0.10
FRESA	Podredumbre gris/ moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>		0.4-0.5	7	*0.5 **5.00
CEBOLLA	Mildiu	<i>Peronospora destructor</i>		0.4-0.5	4	*0.6 **1.00
TOMATE	Podredumbre gris/ moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>		0.4-0.5	6	*1.00 **3.00

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:**

Iniciar los tratamientos cuando las condiciones climatológicas sean favorables para el desarrollo de la enfermedad, debido a la persistencia del producto, el cultivo estará protegido aproximadamente 3 semanas. Realizar un máximo de 2 aplicaciones por campaña por año.

**PERIODO DE REINGRESO:** 12 horas después de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD:**

FOLTEK, es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso agrícola y fertilizantes foliares, excepto aquellos de reacción alcalina. Sin embargo, se recomienda realizar pruebas de compatibilidad en pequeñas dosis.

**FITOTOXICIDAD:**

FOLTEK, no es fitotóxico en las dosis recomendadas.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** El titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.



**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

