

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

# PILON

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULOS SOLUBLES (SG)

Composición:

Acephate.....970 g/Kg  
Aditivos .....c.s.p.1 kg

Reg. PQUA N° - SENASA

Titular del Registro: **LION AGREVO SAC**  
Jirón Sáenz Peña N° 344 Dpto. 105.  
Magdalena del Mar. Lima. Perú.  
Telf: +(511) 6532290

Formulador: **LION AGREVO (NANTONG) Co., Ltd.**  
Forth Yangkou Road, Chemical Industrial Park,  
Yangkou Coastal Economic. Development zone.  
Rudong County, Nantong City, Jiangsu province  
China.  
Teléfono: +86 51384816158  
Fax: +86 51384816178

Importador y distribuidor: **PERÚ FÉRTIL E.I.R.L.**  
Jr. Neón 5681 - Zona Industrial Infantas  
Los Olivos - Lima - Perú  
Teléfonos:949845833 - 999698801  
perufertil@hotmail.com



Fecha de Formulación:  
N° de Lote:  
Contenido neto: **1Kg**  
Fecha de vencimiento:

**NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN**  
**NOCIVO EN CONTACTO CON LA PIEL**  
**NOCIVO SI SE INHALA**



**ATENCIÓN**

215.00 mm

360.00 mm

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"  
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Irritación moderada a los ojos.
- Evite el contacto con la piel y la ropa.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante la manipulación y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- No almacenar en casas de habitación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Organofosforado
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y mostrar la etiqueta.
  - En caso de ingestión, no inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
  - En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
  - En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
  - En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario
  - Antídoto: éste producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:  
SAMU: 106  
LION AGREVO SAC: (01) 653-2290

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o dépositela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para abejas.
- Nocivo para la fauna benéfica.
- No aplicar en época de floración.
- No aplicar en presencia de polinizadores.
- No aplicar si se verifica la presencia de abejas y/o artrópodos benéficos en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
- Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto para el confinamiento de las abejas.
- No aplicar cerca de las colmenas de las abejas, proteger los colmenares antes de la aplicación del producto.
- Aplicar sólo a primeras horas de la mañana o al atardecer cuando las abejas no estén polinizando.
- Evitar que la aplicación esté dirigida a otro tipo de vegetación en floración que atraen polinizadores.
- No aplicar el producto cuando las abejas estén forrajeando activamente en el campo.
- Evitar la deriva del plaguicida hacia colmenas o áreas donde hay cultivos o plantas silvestres floreciendo.
- Muy tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos cinco (5) metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

MECANISMO Y MODO DE ACCIÓN

PILON es un insecticida sistémico que actúa por contacto directo o ingestión. Es un inhibidor de la acetilcolinesterasa en los tejidos del sistema nervioso del insecto. Como resultado, el neurotransmisor se acumula y activa repetidamente los receptores colinérgicos.

MODO DE EMPLEO

PILON se emplea haciendo una pre - mezcla de acuerdo a la dosis indicada con la mitad de volumen de agua a utilizar, agitar hasta que el producto este bien disuelto y completar el volumen de agua en el tanque de aplicación.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

| Cultivo | Plaga                       |                                 | DOSIS<br>Kg/ha | P.C.<br>(días) | L.M.R.<br>(ppm) |
|---------|-----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
|         | Nombre común                | Nombre científico               |                |                |                 |
| Maíz    | “Gusano picador de la hoja” | <i>Elasmopalpus lignosellus</i> | 0.45           | 28             | 0.01            |

L.M.R. = Límite máximo de residuos

PC = periodo de carencia

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Aplicar como máximo 1 aplicación por campaña. Se recomienda una aplicación por campaña durante el desarrollo vegetativo.

PERIODO DE REINGRESO:

No entre a las áreas tratadas durante las 24 primeras horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

PILON es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, sin embargo, se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD:

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podría ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

Categoría toxicológica 4: LIGERAMENTE PELIGROSO

