

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

Attack®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE (WP)

Composición:

Cymoxanil	80 g/Kg
Mancozeb	640 g/Kg
Aditivos	c.s.p. 1kg

Reg. PQUA N° - SENASA

Titular de Registro:



Contenido: 200g
N° de Lote:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

Formulado y distribuido por:
SERFI S.A.
Av. República de Panamá 2577
La Victoria. Lima - Perú.
Telf.: 710-4068

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO



"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO".

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de CUIDADO. No ingerir.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- En contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Almacene el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Si es ingerido: En caso de ingestión accidental del producto provoque vómitos hasta que arroje la mayor cantidad de veneno que tiene en el estómago.
- Si es inhalado: Si aspiró, mueva la persona al aire fresco.
- Recomendaciones generales: Consultar a un médico. Mostrar la etiqueta.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

SANIT. 105
SERFI: (01) 710-4068

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entregue o depositela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligro para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o restos del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 05 metros.
- Peligro para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

ATTACK® es un fungicida con acción preventiva y curativa, mezcla de un fungicida protectante (mancozeb) y uno curativo (cymoxanil).

El mancozeb tiene acción de contacto y actúa inhibiendo la respiración de los hongos. El cymoxanil tiene acción por contacto y actividad sistémica local, inhibiendo la esporulación de los hongos.

Modo de empleo: Calibrar los equipos de aplicación antes de su uso y ajustar el volumen necesario de agua.

Para preparar el caldo de aspersión, colocar el agua en el equipo o tanque de aplicación, luego agregar la cantidad de producto que se va usar, agitar bien y proceder a la aplicación.

ATTACK® se usa en pulverización sobre el follaje, puede aplicarse con equipos de pulverización manual o a motor.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	DOSIS (Kg/200 L)	PC (dias)	LMR (ppm)
AJO	Milidú	Peronospora destructor	0,5	1,0 - 2,0	0,05
CEBOLLA	Milidú	Peronospora destructor	0,5	1,0 - 2,0	0,05
PAPA	Hielo o Rancho	Phytophthora infestans	0,5	1,0 - 2,0	0,3
QUINUA	Milidú	Peronospora farinosa	0,5	1,0 - 2,0	0,05
TOMATE	Hielo o Rancho	Phytophthora infestans	0,5	1,0 - 2,0	0,4
VINO	Milidú	Plasmopara viticola	0,5	2,0	0,10

PC: Período de Carenza / LMR: Límite Máximo de Residuos.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Las aplicaciones deben contemplar los niveles de daño económico de la infección, por lo que se recomienda realizar evaluaciones permanentes al cultivo para determinar los momentos de aplicación.

Realizar como máximo 2 aplicaciones por campaña y 1 al año para los cultivos objetivos.

PERIODO DE REINGRESO

Después de 12 horas de aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayoría de productos. Evitar productos muy ácidos o muy alcalinos. Se recomienda hacer una prueba de compatibilidad antes de realizar la mezcla.

FITOTOXICIDAD

La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrán ocasionar fitotoxidad en el cultivo. Aplicar solo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.

Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.