

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

Attack®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE (WP)

Composición:

Cymoxanil 80 g/Kg
Mancozeb 640 g/Kg
Aditivos c.s.p. 1kg

Reg. PQUA N° - SENASA

Titular de Registro:



Contenido: 500g
N° de Lote:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

Formulado y distribuido por:
SERFI S.A.
Av. República de Panamá 2577
La Victoria. Lima - Perú.
Telf.: 710-4068

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO



"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO".

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de CUIDADO. No ingerir.
- Evita el contacto con la piel y la ropa.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico:** Cymoxanil (Cyanocetamida oxime) y Mancozeb (Ditiocarbamatos)
- En caso de contacto con la piel: Eliminar lavando con jabón y abundante agua.
- En caso de contacto con los ojos: Lavarse abundantemente los ojos con agua como medida de precaución por lo menos durante 15 minutos.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entreguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESechos Y ENVASES VACIOS

- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o del producto contenido en este envase; corresponden a las anotadas sobraes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 05 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
SERFI: 011-710-4068
SAMU: 105

PERIODO DE REINGRESO
Después de 12 horas de aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD
Es compatible con la mayoría de productos. Evitar productos muy ácidos o muy alcalinos. Se recomienda hacer una prueba de compatibilidad antes de realizar la mezcla.

FITOTOXICIDAD
La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrán ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL
El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase; corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados. Si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

MEASURAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE
Peligroso para los organismos acuáticos.
No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	Kg/200 L	Kg/ha	DOSIS		PC (ppm)
					(dias)	PC	
AJO	Milidia	Peronospora destructor	0,5	1,0 - 2,0	15	0,05	0,5
CAPIA	Milidia	Peronospora destructor	0,5	1,0 - 2,0	15	0,05	0,5
CAPIA	Milidia	Phytophthora infestans	0,5	1,0 - 2,0	15	0,01	0,3
CAPIA	Milidia	Phytophthora infestans	0,5	1,0 - 2,0	25	0,01	0,05
CAPIA	Milidia	Phytophthora infestans	0,5	1,0 - 2,0	15	0,4	3,0
VID	Milidia	Plasmopara viticola	0,5	2,0	15	0,10	5,0

Modo de empleo: Calibrar los equipos de aplicación antes de su uso y ajustar el volumen necesario de agua.

Para preparar el caldo de aspersión, colocar el agua en el equipo o tanque de aplicación, luego agregar la cantidad de producto que se va usar, agitar bien y proceder a la aplicación.

ATTACK® se usa en pulverización sobre el follaje, puede aplicarse con equipos de pulverización manual o a motor.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

ATTACK® es un fungicida protector (mancozeb) y uno curativo (cymoxanil) de un fungicida protector (mancozeb) y uno curativo (cymoxanil).

El mancozeb tiene acción y actúa inhibiendo la respiración de los hongos. El cymoxanil tiene acción preventiva y actividad sistémica local, inhibiendo la esporulación de los hongos.