

4 L

MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

# GLISOLAT

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRICOLA

HERBICIDA AGRICOLA

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

Composición:

Glyphosate (Isopropylamine salt)..... 480 g/L  
(Equivalente a 356 g/L Glifosato acido)

Aditivos..... c.s.p. 1L

PQUA N° -SENASA

TITULAR DE REGISTRO:

RAINBOW AGROSCIENCES S.A.C

Av. Alfredo Benavides N° 2150, Int. 701

Urb. El Rosedal, Miraflores - Lima - Perú.

Teléfono: (511) 678-9544



FORMULADOR:

SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO. LTD.

Binhai Economic Development Area Weifang, Shandong 262737, China.

Teléfono: 86-531-88875230 / 88875231

E-mail: rainbowagro@rainbowagro.com

<https://www.rainbowagro.com/>

IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR:

SOLANDINA PERU S.A.C.

Av. Alfredo Benavides N° 2150 - Int. 701

Urb. El Rosedal, Miraflores - Lima - Perú.

Teléfono: +51992763127

Contenido neto: 4 L

Fecha de Formulación:

N° de Lote:

Fecha de vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO

**"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"**  
**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo químico del producto: Fosfonoglicina
- En caso de ingestión: no provocar el vómito. Acudir al médico llevando el envase o la etiqueta del producto. No administrar por vía oral a una persona inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos: Lave con abundante agua y acuda al médico, llevando el envase con la etiqueta del producto.
- En caso de contacto con la piel: Lave con abundante agua y jabón. Si hubiera irritación, acudir al médico.
- En caso de inhalación: mover a la persona a un lugar aislado.
- Este producto no tiene antídoto específico disponible. El tratamiento es sintomático.
- En caso de emergencia llamar a:

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA**

SAMU: 106

RAINBOW AGROSCIENCES: 01- 678-9544

**CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**



**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

- GLISOLAT es un herbicida post-emergente para el control de malezas de hoja ancha, gramíneas anuales y perennes indicadas en el cuadro de uso.
- No tiene efecto residual, al entrar en contacto con el suelo se inactiva. Los efectos visibles de su acción contra las malezas anuales ocurren entre los 2 a 4 días de la aplicación.
- Agitar el frasco antes de mezclarlo con el agua.
- Se puede aplicar con cualquier equipo convencional terrestre.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

**CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO**

| Cultivo   | Plaga                                              |                                                                                                              | Dosis | PC<br>(días) | LMR<br>(ppm) |
|-----------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|
|           | N. Común                                           | N. científico                                                                                                | L/ha  |              |              |
| Mandarina | Coquito<br>Gramia dulce<br>Gramia china<br>Cadillo | <i>Cyperus rotundus</i><br><i>Cynodon dactylon</i><br><i>Sorghum halepense</i><br><i>Cenchrus echinatus</i>  | 2-3   | 7            | 0.2          |
| Vid       | Coquito<br>Gramia china<br>Verdolaga<br>Yuyo       | <i>Cyperus rotundus</i><br><i>Sorghum halepense</i><br><i>Portulaca oleracea</i><br><i>Amaranthus dubius</i> | 4     | 7            | 0.5          |

PC: Periodo de Carencia

LMR: Límite Máximo de Residuos

