

UTRYDER

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)

Composición:

Bensulfuron methyl 600 g/Kg
Aditivos c.s.p. 1 Kg

Reg. PQUA N° - SENASA

Bensulfuron methyl:

Nombre IUPAC: Methyl α-[(4,6-dimethoxyprimidin-2-ylcarbamoil)sulfamoyl]-o-toluate

Peso molecular: 410.4 g/mol
Formula química: C₁₆H₁₈N₄O₅S

PROPIEDADES FÍSICOQUÍMICAS DEL PRODUCTO

Apariencia: Sólido
Color: Marrón claro
Inflamabilidad: No inflamable
Explosividad: No explosivo
Corrosividad: No corrosivo

Nocivo en caso de ingestión
Nocivo en contacto con la piel
Nocivo si se inhala

Muy tóxico para organismos acuáticos



PELIGRO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilizar ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación.
- Usar el equipo de protección personal: mascarilla, guantes, botas y lentes protectores durante la aplicación.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Guardar este producto en ambientes cerrados, secos y aireados.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

- **Grupo químico: Sulfonilurea**
- **Ingestión:** Enjuagar la boca con agua. No induzca el vómito sin supervisión médica. Nunca le dé nada por la boca a una persona inconsciente o si presenta convulsiones. Llame a un médico o al centro de control de intoxicaciones de inmediato.
- **Inhalación:** Traslade a la víctima al aire libre. Si la respiración es difícil, proporcione oxígeno. Si no respira, administre respiración artificial y consulte a un médico de inmediato.
- **Contacto con la piel:** Qúitese inmediatamente la ropa contaminada. Lavar con jabón y abundante agua. Consultar a un médico.
- **Contacto con los ojos:** Enjuague con abundante agua pura durante al menos 15 minutos, manteniendo los párpados elevados. Consultar a un médico.
- **Antídoto:** El producto no tiene antídoto específico, tratamiento sintomático.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido del producto, destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
- MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:**
- Muy tóxico para organismos acuáticos.
 - No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
 - Para la protección de la flora terrestre o acuática, evite contaminar áreas fuera del cultivo a tratar. No aplique cuando las condiciones ambientales favorezcan el arrastre del producto hacia otras áreas.
 - No lave o enjuague el equipo de aplicación cerca de árboles u otras plantas con raíces extendidas o en situaciones en las que por el movimiento del suelo o filtración, estas plantas puedan entrar en contacto con el herbicida.
 - Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
 - En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.
 - El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
 - No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
 - Respetar una banda de NO aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
 - El producto no debe aplicarse en napas freáticas superficiales o suelos altamente permeables

TELEFONOS DE EMERGENCIA:

SAMU: 106
SHARDA PERU SAC: 222-2695



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

UTRYDER es un herbicida de acción sistémica selectivo. Tiene como ingrediente activo a Bensulfuron methyl, el cual es absorbido vía foliar y radicular de la maleza. Actúa inhibiendo la enzima acetolactato sintasa (ALS), es decir, actúa mediante la inhibición de la biosíntesis de los aminoácidos esenciales isoleucina, leucina y valina, lo que impide el crecimiento de las raíces y brotes de las malezas, causando clorosis, necrosis, malformación de las hojas y decoloración, ocasionando finalmente la muerte de las malezas.

UTRYDER se aplica en forma de aspersión foliar, para la preparación de la mezcla, llene el cilindro o tanque de aplicación con agua limpia hasta la mitad y luego agregue el producto revolviendo constantemente. Complete luego hasta el volumen deseado. Se aplica con cualquier equipo convencional terrestre en buen estado (pulverizador manual o accionado por el tractor) y debidamente calibrado, que asegure una adecuada cobertura sobre las malezas.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGA		DOSIS kg/ha	P.C. (días)	L.M.R. (mg/kg)
	Nombre común	Nombre científico			
Arroz	"Moco de pavo" "Coquito"	<i>Echinochloa crus-galli</i> <i>Cyperus difformis</i>	0.2	60	0.01

P.C. : Período de carencia LMR : Límite máximo de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Se recomienda aplicar **UTRYDER** cuando las malezas tengan 1 a 4 hojas verdaderas. Realizar una aplicación por campaña.

PERIODO DE REINGRESO:

No ingresar al área tratada hasta después de 12 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

UTRYDER es compatible con la mayoría de plaguicidas. Sin embargo, se recomienda hacer una prueba de compatibilidad previa.

FITOTOXICIDAD:

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar solo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

UTRYDER

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)

Composición:

Bensulfuron methyl 600 g/Kg
Aditivos c.s.p. 1 Kg

Reg. PQUA N° - SENASA

Titular del Registro:
SHARDA PERU S.A.C
Calle Las Castañitas 138
Urb. El Palomar, San Isidro
Teléfono: 222-2695

Importado y distribuido por:
SHARDA PERU S.A.C
Calle Las Castañitas 138
Urb. El Palomar, San Isidro
Teléfono: 222-2695

Formulado por:
SHARDA CROP CHEM LIMITED
CHINA OFFICE
Room 1803, B Zone, Yunting building,
No. 216 Qingguoxiang, Changzhou,
Jiangsu, CHINA. Telf: 0519-88172050

Nocivo en caso de ingestión
Nocivo en contacto con la piel
Nocivo si se inhala

Muy tóxico para organismos acuáticos



PELIGRO

