PROYECTO DE ETIQUETA XTREM L x 20 L 02.01.25

**"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"**
**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación del producto.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de Ingestión: No administre nada por vía oral a una persona inconsciente. No inducir al vómito. Llame al médico inmediatamente.
- En caso de contacto con los ojos: Enjuagar los ojos con abundante agua por al menos 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel: Retirar la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación: Salir al aire libre si se producen efectos adversos. Consultar a un médico.
- Antídoto: No existe antídoto específico. Tratamiento sintomático.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**
**SAMU: 106 / NEXXT S.A.C.: (01) 3261910**

**CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

# XTREM L

**REGULADOR DE CRECIMIENTO DE PLANTAS DE USO AGRÍCOLA**

**CONCENTRADO SOLUBLE (SL)**

**Composición:**

| | |
|---|---|
| Auxinas | 0.038 g/L |
| Citoquininas | 3.4 g/L |
| Giberelinas | 0.04 g/L |
| Aditivos | c.s.p. 1 L |

**Reg. RCP N° XXXX - SENASA**

**Titular de Registro y Formulador:**
**NEXXT S.A.C.**
Av. Mariscal Eloy Ureta No. 156
Urb. El Pino (Piso 1 y 3)
San Luis, Lima-Perú
Teléfono:(01) 3261910

**Fecha de Formulación:**
**Nº de Lote:**
**Contenido Neto: 20 L**
**Fecha de vencimiento:**

**NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**
**XTREM L** es un regulador de crecimiento de plantas compuesto por auxinas, citoquininas y giberelinas. Las auxinas intervienen en la formación de raíces, tallos, hojas y frutos; las citoquininas promueven la división, diferenciación celular e intervienen en el desarrollo y crecimiento de los frutos; mientras que las giberelinas inducen el crecimiento celular de los tejidos y de la floración.
**XTREM L** se aplica vía foliar, diluido en agua. **XTREM L** se debe preparar diluyendo la dosis indicada en un recipiente previo con agua, luego esta solución se lleva al cilindro o mochila según el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, manteniendo siempre agitación constante y se procede a aplicar.

**"Consulte con un ingeniero agrónomo"**

| Cultivo | Momento de aplicación | Dosis (L/200L) | P.C. (días) | L.M.R. (ppm) |
|---|---|---|---|---|
| Arándano | Floración / fructificación | 0.30 - 0.50 | N.A. | N.A. |
| Mandarina | Inicio de la fructificación | 0.20 - 0.40 | N.A. | N.A. |
| Palto | Inicio de la fructificación | 0.20 - 0.40 | N.A. | N.A. |
| Vid | Fructificación | 0.30 - 0.40 | N.A. | N.A. |

**P.C: Periodo de carencia L.M.R.: Límite Máximo de Residuos N.A.: No aplica**

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**
Se indica 2 a 3 aplicaciones de **XTREM L** por campaña en cada cultivo recomendado en el cuadro de usos, considerando una campaña por año.

**PERIODO DE REINGRESO**
No hay un periodo de ingreso. Está exento.

**COMPATIBILIDAD**
**XTREM L** es compatible con plaguicidas de uso común, excepto con sustancias alcalinas. Se recomienda efectuar una confirmación previa de compatibilidad.

**FITOTOXICIDAD**
La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**
El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

**PRECAUCIÓN**