

Amistrobin

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)

Composición:

Azoxystrobin.....500 g/kg

Aditivos.....c.s.p.1 kg

Reg. PQUA N° 622 - SENASA

Titular del registro:
SOCIEDAD ANONIMA FAUSTO PIAGGIO

Formulado por:
ZHEJIANG CHEMICALS IMPORT
AND EXPORT CORPORATION
No. 37 Qing Chun Road, Hangzhou,
Zhejiang Province, P.R. China.

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:
SOCIEDAD ANONIMA **Fausto Piaggio**

Av. Guillermo Dansey 2045,
Cercado de Lima, Perú.
Telf.: 464-2222 Fax: 464-2211
Email: ventas@piaggio.com.pe
RUC: 20100244471



Contenido Neto: 25 K

Lote N°:
Fecha de Form.:
Fecha de Venc.:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO "MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Ligeramente peligroso por inhalación.
- Moderadamente irritante a los ojos.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Este producto es mortal si se ingiere.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilice el equipo de protección durante la mezcla y aplicación (guantes de goma, máscara contra el polvo, respirador u otros) y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No re-ensasar o depositar el contenido en otros envases.
- Resalice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:

Grupo Químico: Estrobilurina
En caso de intoxicación llamar al médico inmediatamente, o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
En caso de contacto con los ojos enjuagarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos.
En caso de contacto con la piel retirar la ropa contaminada y limpiar la zona expuesta con agua abundante y jabón.
En caso de ingestión no inducir el vómito; avisar a un médico. Si la persona está consciente dar de beber agua.
En caso de inhalación colocar a la persona en un sitio con aire fresco y monitorear que no exista dificultad respiratoria, si existe practicar respiración artificial.
Nota al médico: trátese sintómicamente, no tiene antídoto específico.

En caso de emergencia llamar a los teléfonos:
ESSALUD EN LÍNEA: 411-8000 (Opción 4)
CETOX: 080071911 (Línea gratuita)
CISPROQUIM: 0800-50847
CICOTOX 0800-13-040

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:
Después de usar el contenido, destruya este envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:
Peligroso para organismos acuáticos.
No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO" CUADRO DE DOSIS Y USOS

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS		Periodo de carencia* (días)	LMR** (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	g/lit 200 L	g/ha		
Alcachofa	Oidium	<i>Leveillula taurica</i>	60	-	0	5
Cebolla	Mancha del peral	<i>Stemphylium vesicarium</i>	80	-	0	1
Espárrago	Mancha púrpura	<i>Stemphylium vesicarium</i>	80	200	7	0.01
Fresa	Podredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	100	-	0	10
Mandarina	Mancha negra de la hoja	<i>Alternaria alternata</i>	40-45	-	0	15
Palto	Botrytis	<i>Botrytis cinerea</i>	40-55	150-200	0	0.05
Papa	Tizon temprano	<i>Alternaria solani</i>	80	-	7	7
Vid	Oidium	<i>Erysiphe necator</i>	50	200	14	2
	Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	40-60	142-225	14	2

*Última aplicación antes de la cosecha **Límite máximo de residuos (ppm) n.d.: no determinado

Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir el ingreso de animales al área tratada.
El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

AMISTROBIN es un fungicida sistémico y translinamar del grupo de las estrobilurinas. Posee propiedades protectantes, curativas y erradicantes. Inhibe la germinación de las esporas y el crecimiento micelial, también muestra actividad antiesporulante.
Agregar lentamente los gránulos en el tanque y mantenerlo en agitación mientras se está aplicando. No pre-mezclar el producto.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Realizar un máximo de dos aplicaciones por campaña/año. El intervalo entre aplicaciones de AMISTROBIN es de 20 días. Aplicar cuando las condiciones medioambientales sean favorables para el desarrollo de la enfermedad. Toda aplicación debe ser posterior a una evaluación rigurosa del cultivo, el nivel de daño dependerá de la interacción enfermedad-cultivo. Rotar con plaguicidas de diferente grupo químico entre aplicaciones.

PERIODO DE REINGRESO:

No entre a las áreas tratadas durante 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

Compatible con la mayoría de plaguicidas, excepto con productos de reacción alcalina. Evitar agentes oxidantes. En caso de duda se recomienda efectuar previamente una prueba de compatibilidad a la dosis recomendada.

FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico si es usado a la dosis y uso recomendados.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase concuerdan con la descripción indicada en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

