

23.40 cm

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es dañino. No ingerir.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Utilizar ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

#### INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: Avermectin + Neonicotinoide.
- No existe antídoto específico. El tratamiento es sintomático.
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y mostrar la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por los menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:  
SAMU: 106  
SHARDA PERU SAC: 222 - 2695

#### CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de accepio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase

#### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Tóxico para abejas u artrópodos beneficios. No aplicar en época de floración.
- No aplicar en presencia de polinizadores.
- No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o en cultivos aledaños.
- Aplicar temprano en las mañanas o muy en las tardes. Evitar la deriva por el viento.
- Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

# MIRLO®

## PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

### ACARICIDA - NEMATICIDA AGRÍCOLA

#### SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

#### Composición:

Abamectin..... 36 g/L  
Thiamethoxam..... 72 g/L  
Aditivos c.s.p..... 1 L

Reg. PQUA N° 3742 - SENASA

Titular del Registro:  
**SHARDA PERU S.A.C**  
Calle Las Castañitas 138  
Urb. El Palomar, San Isidro  
Teléfono: 222-2695

Formulado por:  
**SHARDA CROPCHEM LIMITED**  
CHINA OFFICE  
Room 1803, B Zone, Yunting  
building, No. 216 Qingguoxiang,  
Changzhou, Jiangsu, CHINA.  
Telf: 0519-88172050

Importado y distribuido por:  
**SANIVÉG PERU S.A.C**  
Av. San Jenaro 235  
Urb. Industrial, Puente Piedra  
Teléfono: 637 - 1269



Contenido Neto: 500 ml

Lote N°:  
Fecha de Form.:  
Fecha de Venc.:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO



**MODERADAMENTE PELIGROSO**  
**DANINO**

#### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

MIRLO es un insecticida traslaminar que actúa por contacto e ingestión. Está formado por dos ingredientes activos: Abamectin que inhibe la transmisión neuromuscular de los insectos, llevándolos a la parálisis muscular y una consecuente muerte. Thiamethoxam que actúa dañando el sistema nervioso del insecto conduciéndolo a la muerte.

Aplicar MIRLO con equipos convencionales. Para la preparación de la mezcla, llene el cilindro o tanque de aplicación con agua limpia hasta la mitad y luego el producto revolviendo constantemente. Completar luego hasta el volumen deseado.

"CONSULTE A UN INGENIERO AGRÓNOMO"

| CULTIVO   | PLAGA                          |                               | DOSIS<br>L/ha | P.C.<br>(días) | L.M.R.<br>(ppm) |
|-----------|--------------------------------|-------------------------------|---------------|----------------|-----------------|
|           | Nombre Común                   | Nombre Técnico                |               |                |                 |
| Mandarina | "Ácaro del tostado"            | <i>Phyllocoptura oleivora</i> | 0.125         | 28             | 0.02*<br>0.4"   |
| Cebolla   | "Nematodo del nudo de la raíz" | <i>Meloidogyne incognita</i>  | 2.0           | 30             | 0.01*<br>0.01"  |
| Vid       | "Nematodo del nudo de la raíz" | <i>Meloidogyne incognita</i>  | 2.0           | 21             | 0.01*<br>0.7"   |

L.M.R. = Límite máximo de residuos

PC = periodo de carencia

a: Abamectin, b: Thiamethoxam

#### FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:

MIRLO se debe aplicar cuando se observen los primeros daños del insecto. Realizar un máximo de 2 aplicaciones por campaña, con un intervalo de 15 días en el cultivo de mandarina.

Para los cultivos de cebolla y vid, realizar 1 aplicación por campaña, con una campaña al año, las aplicaciones se deben realizar vía drench o sistema de riego, con el suelo en capacidad de campo.

Se recomienda rotar con productos de diferentes modos de acción.

**PERIODO DE REINGRESO:** No reingresar sin protección a un campo aplicado hasta después de 24 horas después de la aplicación. Mantener alejado al ganado durante este periodo.

#### COMPATIBILIDAD:

MIRLO es compatible con la mayoría de fitosanitarios de uso común. Se recomienda, antes de efectuar una mezcla, realizar una prueba de compatibilidad.

#### FITOTOXICIDAD:

MIRLO no ha mostrado síntomas de fitotoxicidad luego de ser aplicado a la dosis recomendada.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

