MEDIDAS: 24 x 13.5cm

FEBRERO DEL 2025

AG

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN
-No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
-Durante la manipulación y aplicación, y para ingresar al área tratada de acuerdo con el periodo de reingreso, use camisa de manga larga, pantalón largo, botas, visor, tapabocas o máscara y guantes.
-Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado, alejado de alimentos y medicinas para uso humano y veterinario bajo condiciones que garanticen su conservación.
-Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.
-No almacenar ni transportar junto a alimentos, bebidas o medicinas tanto de uso humano como animal.
-No aplicar cuando haya vientos fuertes para evitar daños a cultivos susceptibles, ni en horas de elevadas temperaturas.
-No re envasar o depositar el contenido en otros envases.
-Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS
-Grupo químico: Triazole (Difenoconazole); Pyridilethylamide (Fluopyram)
-En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
-En caso de contacto con los ojos, enjuagar inmediatamente con abundante agua, también debajo de los párpados durante al menos 15 minutos. Si los tiene, retirar los lentes de contacto después de los primeros 5 minutos, luego continuar enjuagando los ojos. Si la irritación persiste, buscar atención médica.
-Si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
-En caso de ingestión, enjuagar la boca. No induzca el vómito, acuda inmediatamente a la unidad de salud más cercana.
-En caso de inhalación, llevar al paciente al aire fresco y manténgalo en reposo, llamar al médico.
-Antídoto: No existe antídoto específico. Dar tratamiento sintomático.
-En caso de emergencia llamar a los siguientes teléfonos:

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
SAMU: 106
INFOSALUD: 113
MONTANA SA: (01) 419-3000

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS
-Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
-Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
-Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE
-Muy tóxico para organismos acuáticos.
-Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
-No contaminar los ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
-No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación sobrantes del producto.
-Respetar una banda de no aplicación hacía cuerpos de agua de al menos 10 metros.
-El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
-En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

Nepiram®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Composición:
Difenoconazole ..... 250.0 g/L
Fluopyram ..... 200.0 g/L
Aditivos ..... c.s.p.1 L

Reg. PQUA N° XXXX-SENASA

Titular del Registro:
MONTANA

Formulado y distribuido por: MONTANA S.A.
Av. Javier Prado Este Nº 6210, Ofi. 401, La Molina. Lima - Perú.
Teléfonos: (511) 4193000
E-mail: info@corpmontana.com

Contenido neto: 20 L

Lote N°:

Fecha de Form.:

Fecha de Venc.:

Nocivo en caso de Ingestión
Nocivo en contacto con la piel
Nocivo si se inhala

Muy tóxico para organismos acuáticos

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
NEPIRAM es un fungicida sistémico y translaminar de acción preventiva y curativa. Está compuesto por dos ingredientes activos. Difenoconazole actúa inhibiendo la síntesis de ergosterol, provocando la pérdida de funcionabilidad de la membrana celular y como resultado final, el detenimiento total del crecimiento interno del hongo. Fluopyram inhibe la respiración mitocondrial del hongo. Tiene actividad en las diferentes fases del ciclo de vida del hongo: como la germinación de esporas, elongación del tubo germinativo, crecimiento del micelio y esporulación.
NEPIRAM se aplica en mezcla con agua. Para la aplicación, se debe llenar el tanque de aplicación hasta la mitad o ¾ partes de su capacidad, agitar bien el envase del producto y hacer una premezcla con una reducida cantidad de agua, en un balde o recipiente aparte, agitar bien hasta formar una mezcla homogénea, vierta la mezcla al tanque de aplicación y complete el volumen de agua a utilizar. Es recomendable que el equipo cuente con un buen sistema de agitación.
NEPIRAM puede ser aplicado con pulverizadores manuales de palanca (mochila), motopulverizadores, equipos estacionarios o accionados por tractores. Los pulverizadores deben estar en buen estado y ser calibrados antes de ser utilizados.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	L/200L	L/ha		
Vid	"Oidiosis"	*Erysiphe necator*	0.15 - 0.20	0.9 - 1.2 [c]	7	3 [a] 2 [b]

PC: Periodo de carencia
LMR: Límite máximo de residuos
[a] Difenoconazole [b] Fluopyram
[c] Gasto de agua: 1200 L/ha

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN
Para el cultivo vid realizar como máximo dos (2) aplicaciones por campaña, con un intervalo de aplicación de 15 días entre ellas.
Realizar la aplicación a la aparición de los primeros síntomas de la enfermedad, o de manera preventiva cuando se den las condiciones favorables para el desarrollo de la enfermedad.
Rotar con fungicidas con diferente mecanismo de acción para evitar el desarrollo de resistencia.

PERIODO DE REINGRESO:
Puede reingresar al área tratada 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD
NEPIRAM es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios de uso común. Se recomienda hacer pruebas de compatibilidad con el producto que se desee utilizar antes de efectuar una mezcla.

FITOTOXICIDAD
NEPIRAM no es fitotóxico usado a la dosis y en el cultivo recomendado en la presente etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL
El titular de registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4 - LIGERAMENTE PELIGROSO

PELIGRO

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA