

28.50 cm

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- Utilice ropa protectora durante la manipulación y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- Evite almacenar por encima de los 35°C.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo Químico: Cyclohexanodiona.
- En caso de intoxicación brindar asistencia médica y muestre la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona esta inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático y de soporte.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA**

ESSALUD: 0801-10200 (línea gratuita) SAMU: 106  
UPL PERÚ S.A.C.: (01) 611-0831

**CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos diez (10) metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

# CENTURION®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

## HERBICIDA AGRÍCOLA

### CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

**Composición:**

Clethodim ..... 125 g/L  
Aditivos ..... c.s.p 1 L

PQUA N° SENASA

**Titular del Registro:**

**UPL PERÚ S.A.C.**  
Jr. Caracas N° 2226 Urb. Oyague  
Jesús María - Lima - Perú  
Teléfono: (01) 611-0831



**Formulado por:**

**Arysta LifeScience North America, LLC**  
15401 Weston Parkway,  
Suite 150, Cary, NC USA

**Importado y Distribuido por:**

**FARMEX S.A.**  
Calle Dean Valdivia N° 148 Piso 7  
San Isidro, Lima 27 - PERÚ  
Teléfono: (01) 630-6400 www.farmex.com.pe



Fecha de Formulación:

N° de Lote:

**Contenido Neto: 1 L**

Fecha de vencimiento:

© Marca registrada por UPL Perú S.A.C.

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

**CENTURION®** es un herbicida gramínicida de acción post-emergente, efectivo en el control de gramíneas anuales y perennes, pero sin efecto contra malezas de hoja ancha ni ciperáceas. **CENTURION®** es absorbido rápidamente por las hojas, trasladándose hasta las raíces y rizomas. Las gramíneas cultivadas no son tolerantes a **CENTURION®**, en cambio los cultivos de hoja ancha muestran una excelente tolerancia. Los mejores resultados se obtienen cuando las malezas están en crecimiento activo, bajo buenas condiciones de humedad y no pasan de 20 a 30 cm de altura.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

CULTIVO	MALEZAS		DOSIS (L/200 L)	DOSIS (L/Ha)	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre común	Nombre científico				
ALCACHOFA	Rabo de zorro	<i>Setaria geniculata</i>	0.6	1.2	40	0.5
	Pata de gallina	<i>Eleusine indica</i>				
	Cadillo	<i>Cenchrus echinatus</i>				
	Gramma china	<i>Sorghum halepense</i>				
ALGODONERO	Rabo de zorro	<i>Setaria sp.</i>	0.5 - 0.6	1.0 - 1.2	14	0.5
PIMIENTO ( <i>Capsicum annuum</i> )	Rabo de zorro	<i>Setaria geniculata</i>	0.6	1.2	20	0.5
	Gramma dulce	<i>Cynodon dactylon</i>				
	Moco de pavo	<i>Echinochloa crusgavonis</i>				
CEBOLLA	Pata de gallina	<i>Eleusine indica</i>	0.5 - 0.6	1.0 - 1.2	54	0.5
ESPÁRRAGO	Gramma dulce	<i>Cynodon dactylon</i>	0.5 - 0.75	0.75 - 1.125	1	0.5
MANDARINA	Gramma china	<i>Sorghum halepense</i>	0.5 - 0.6	1.0 - 1.2	5	0.1
VID	Cadillo	<i>Cenchrus echinatus</i>	0.5 - 0.6	1.0 - 1.2	20	1
PIJUAYO	Pata de gallina	<i>Eleusine indica</i>	0.5 - 0.6	0.5 - 0.6	0	0.5
	Rabo de zorro	<i>Leptochloa fusca</i>				
	Pajilla	<i>Chloris radiata</i>				

P.C.: Periodo de carencia

L.M.R.: Limite máximo de residuos

N.A.: No aplica

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:** La aplicación de **CENTURION®** se realizará previo monitoreo de campo. Se recomienda no más de 2 aplicaciones por campaña, con intervalos de 10 - 14 días. Rotar con Herbicidas de diferente grupo químico entre aplicaciones.

Para el cultivo de Pijuayo, la aplicación se encuentra restringida entre los primeros 6 a 9 meses luego del trasplante. Realizar máximo 1 aplicación por campaña.

**PERIODO DE REINGRESO:** No entrar al área tratada dentro de 24 horas después de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD:** **CENTURION®** se mezcla fácilmente en agua. No se recomienda mezclarlo con fertilizantes ni productos de reacción alcalina. Se encontró un ligero antagonismo en los tanques de mezcla con algunos herbicidas post-emergentes de hoja ancha.

**FITOTOXICIDAD:** La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.



LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO



15.00 cm