



PORYGON

625 WG

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)

Fludioxonil	250 g/Kg
Cyprodinil.....	375 g/Kg
Aditivos	c.s.p. 1Kg

REG. PQUA N° ... - SENASA



BIOTECH

Biotecnología para su cultivo

Av. Antonio Miroquesada 425 - OF.1007
Magdalena del Mar

Importado y Distribuido por:

BIOTECH CORP S.AC.
Av. Antonio Miroquesada 425 -
OF.1007 Magdalena del Mar

Formulado por:

NANJING ESSENCE FINE-CHEMICAL CO.,LTD.
4th Floor, Building 5, No. 150 Pubin Road, Nanjing
211800, China.

N° Lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

Contenido Neto: **5 kg**

"Nocivo en caso de ingestión"
"Nocivo en contacto con la piel"
"Nocivo si se inhala"

"Muy tóxico para los
organismos acuáticos"



PELIGRO

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Causa irritación moderada a los ojos
- Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Durante la manipulación y aplicación, y para ingresar al área tratada de acuerdo al periodo de reentrada (24 horas) use camisa de manga larga, pantalón largo, botas, visor, tapabocas o máscara y guantes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada por separada y báñese con abundante agua y jabón.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para su consumo.
- Mantener el producto en el envase original, etiquetado y cerrado, alejado de alimentos y medicinas para uso humano y veterinario, bajo condiciones que garanticen su conservación.
- El uso inadecuado de este producto causa daños a la salud y al ambiente.
- No almacenar en casa de habitación.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Fludioxonil: Fenilpirrol; Cyprodinil: Anilino pirimidinas
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados. Retirar lentes de contacto si los hubiera.
- En caso de contacto con la piel, retire la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: Este producto no tiene antídoto específico. EL tratamiento es sintomático y de soporte.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

SAMU: 106 | BIOTECH CORP SAC: 981 297934.

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍO

Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Muy tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar los ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- Evitar el uso del producto en zonas con napas freáticas superficiales o suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

PORYGON 625 WG, es un fungicida compuesto por dos ingredientes activos cuyo modo de acción es Fludioxonil (Contacto) y Cyprodinil (Sistémico) y dos mecanismos diferentes de acción Fludioxonil inhibe la proteína quinasa afectando el crecimiento conidial y micelial, así como el crecimiento de los tubos germinales. Mientras que Cyprodinil interfiere en el ciclo fúngico principalmente durante las fases de penetración y crecimiento del micelio dentro del tejido vegetal.

PORYGON 625 WG, para la preparación de la mezcla, llene el cilindro o tanque de aplicación con agua limpia hasta la mitad o 3/4 parte, hacer una premezcla en una reducida cantidad de agua en un recipiente o balde, mover hasta formar una mezcla homogénea, luego verter al tanque de aplicación y completar el agua a utilizar.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

En el cultivo de vid se aplica preventivamente o cuando se observen los primeros síntomas de la enfermedad. Realizar como máximo 2 aplicaciones por campaña, considerando una campaña por año.

PERÍODO DE REINGRESO

Ingresar al área tratada 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

No mezcle **PORYGON 625 WG** con agentes fuertemente oxidantes, ácidos y bases fuertes. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico en los cultivos en que se recomienda, si se utiliza de acuerdo a las instrucciones de la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

CATEGORIA TOXICOLOGICA 4: LIGERAMENTE PELIGROSO

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS	PC (días)	LMR (ppm)
	N. común	N. Científico	(Kg/Ha)		
Vid	Moho Gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.8 - 1.0	7	2* / 3**

*Fludioxonil

**Cyprodinil

P.C.: Periodo de carencia

L.M.R.: Límite máximo de residuos

