

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

# Stricto®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)

**COMPOSICIÓN:**

DINOTEFURAN.....500 g/kg  
Aditivos.....c.s.p. 1 kg

Reg. PQUA N° 1127 – SENASA

 **INTEROC**

*Pasión por la innovación*



**Titular de Registro,  
Importador y Distribuidor:**  
**INTEROC S.A.**  
Av. Javier Prado Oeste 2442  
Piso 16. Magdalena Del Mar  
Lima - Perú  
Telf.: (51 1) 614-5100

**Formulador:**  
**NINGBO SUNJOY  
AGROSCIENCE CO., LTD.**  
165 Beihai Road, Chemical  
Industry Zone of Ningbo,  
Zhejiang Province - China

**Contenido Neto: 1 kg**  
**Fecha de Formulación:**  
**N° de Lote:**  
**Fecha de Vencimiento:**



**NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO**

**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

Este producto es dañino, no ingerir ni inhalar la aspersión.  
Utilice el equipo de protección durante la mezcla, aplicación y para ingresar a la área tratada en las primeras 12 horas.

No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.

Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa y báñese con abundante agua y jabón.

Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado, en un lugar bajo techo, fresco, seco y ventilado.

No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas o forrajes.

No utilizar el envase vacío para almacenar bebidas ni alimentos.

**INSTRUCCION DE PRIMEROS AUXILIOS**

**Grupo Químico:** Neonicotinoide.

**En caso de intoxicación o ingestión,** lleve al paciente inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta.

**En caso de ingestión,** enjuagar la boca con agua si está consciente. No provoque el vómito.

**En contacto con los ojos,** lávelos inmediatamente con agua limpia durante 15 minutos.

**En contacto con la piel,** quitar la ropa y lavar la piel con abundante agua y jabón.

**En caso de Inhalación,** retire al paciente a un lugar fresco y aplique respiración artificial si fuera necesario.

Después de la aplicación lavarse las manos y el resto del cuerpo con abundante agua y jabón.

**NOTA AL MÉDICO**

**ANTÍDOTO:** No existe antídoto específico. Proporcione tratamiento sintomático.

**TELÉFONO DE EMERGENCIAS**

**SAMU: 106**

**INTEROC S.A. (511) 614-5100**

**CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilicelo la funda o bolsa cortandola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**

Tóxico para abejas y artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración, ni en presencia de abejas o polinizadores en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.

Notificar a los apicultores antes de aplicar el producto, para el confinamiento de sus abejas.

Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes. Evitar la deriva.

Peligroso para peces y demás organismos acuáticos, plantas acuáticas y semi-acuáticas.

No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de la aplicación, sobantes del producto o envases vacíos.

No aplicar en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.

Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos 10 metros.

Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.

En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**STRICTO®** pertenece al grupo de los neonicotinoides, con acción sistémica y actúa por contacto e ingestión sobre los insectos, afectando su sistema nervioso, específicamente sus receptores nicotínicos, los que les causa la parálisis y luego la muerte.

**STRICTO®** se aplica en aspersión con equipos de aspersión terrestre, previa mezcla con agua. Preparar una premezcla de acuerdo a la dosis indicada con la mitad de volumen del agua a utilizar, agitar hasta que el producto este bien disuelto y completar el volumen de la aplicación. Calibrar el equipo previamente.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

Aplicar previa evaluación.

Realizar como máximo 2 aplicaciones por campaña/año. Considerando 2 campañas al año. La segunda aplicación con un intervalo de aplicación de 30 días en tomate y 15 días en espárrago. La dosis máxima es de 0.2 Kg/ha.

En caso se requiera una nueva aplicación, usar otro insecticida de diferente mecanismo de acción, a fin de evitar la resistencia.

Para el cultivo de arroz y pimiento maximo 2 aplicaciones por campaña/año y para los cultivos de palto y vid una aplicación por campaña/año.

**PERÍODO DE REINGRESO**

Se recomienda no ingresar al área tratada, sin equipo de protección, hasta 24 horas después de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD**

Es compatible con la mayoría de productos fitosanitarios.

**FITOTOXICIDAD**

El producto no presenta efectos fitotóxicos a la dosis recomendada.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El Titular del Registro garantiza que las características físico - químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto".

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	N. COMÚN	N. CIENTÍFICO	kg/200L	kg/ha		
Tomate <i>Lycopersicon esculentum</i>	Mosca blanca	<i>Bemisia tabaci</i>	0.1	-	1	1
	Caracha (Mosquilla de los brotes)	<i>Prodioplosis longifila</i>	0.20	-	1	
Espárrago <i>Asparagus officinalis</i>	Caracha (Mosquilla de los brotes)	<i>Prodioplosis longifila</i>	0.20	-	7	0.5
	Arroz <i>Oryza sativa</i>	Mosquilla del arroz	<i>Hydrellia wirthi</i>	0.10	-	7
Pimiento <i>Capsicum annuum</i>	Caracha (Mosquilla de los brotes)	<i>Prodioplosis longifila</i>	0.20	-	21	0.5
Palto <i>Persea americana</i>	Escama Latania	<i>Hemiberlesia lataniae</i>	-	0.8 - 1.2	120	0.01
Vid <i>Vitis vinifera</i>	Cochinilla harinosa	<i>Planococcus citri</i> - <i>Planococcus ficus</i>	0.07-0.09	-	28	0.01

**Uso en Invernadero o casa malla**

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	N. COMÚN	N. CIENTÍFICO	kg/200L	kg/ha		
Pimiento <i>Capsicum annuum</i>	Caracha (Mosquilla de los brotes)	<i>Prodioplosis longifila</i>	0.20	-	21	0.5

**PC:** Periodo de Carenacia

**LMR:** Limite Máximo de Residuos **ppm:** Partes por millón



“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

# Stricto®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)

**COMPOSICIÓN:**

DINOTEFURAN.....500 g/kg  
Aditivos.....c.s.p. 1 kg

Reg. PQUA N° 1127 – SENASA

 **INTEROC**

*Pasión por la innovación*

**Titular de Registro,  
Importador y Distribuidor:  
INTEROC S.A.**

Av. Javier Prado Oeste 2442  
Piso 16. Magdalena Del Mar  
Lima - Perú  
Telf.: (51 1) 614-5100

**Formulador:**

**FORWARD (BEIHAI) HEPU  
PESTICIDE CO., LTD.**

N°1 Qingshuijiang, Lianzhou, Hepu  
Beihai Guangxi - China  
Telf.: (0779) 7223161

**Contenido Neto: 1 kg**

**Fecha de Formulación:**

**N° de Lote:**

**Fecha de Vencimiento:**



**NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO**

**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**



“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

# Stricto®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)

**COMPOSICIÓN:**

DINOTEFURAN.....500 g/kg  
Aditivos.....c.s.p. 1 kg

Reg. PQUA N° 1127 – SENASA

 **INTEROC**

*Pasión por la innovación*


**Titular de Registro,  
Importador y Distribuidor:**  
**INTEROC S.A.**

Av. Javier Prado Oeste 2442  
Piso 16. Magdalena Del Mar  
Lima - Perú  
Telf.: (51 1) 614-5100

**Formulador:**  
**NINGBO GENERIC  
CHEMICAL CO., LTD.**

Room 10-6, Shidai Square, No. 8,  
Lengjing Street, Ningbo 315010  
Telf.: +86 574 87301088  
Zhejiang, China

**Contenido Neto: 1 kg**  
**Fecha de Formulación:**  
**N° de Lote:**  
**Fecha de Vencimiento:**



**NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO**

**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

**LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

Este producto es dañino, no ingerir ni inhalar la aspersión.  
Utilice el equipo de protección durante la mezcla, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas.

No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.

Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa y báñese con abundante agua y jabón.

Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado, en un lugar bajo techo, fresco, seco y ventilado.

No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas o forrajes.

No utilizar el envase vacío para almacenar bebidas ni alimentos.

**INSTRUCCIÓN DE PRIMEROS AUXILIOS**

**Grupo Químico:** Neonicotinoide.

**En caso de intoxicación o ingestión,** lleve al paciente inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta.

**En caso de ingestión,** enjuagar la boca con agua si está consciente. No provoque el vómito.

**En contacto con los ojos,** lávelos inmediatamente con agua limpia durante 15 minutos.

**En contacto con la piel,** quitar la ropa y lavar la piel con abundante agua y jabón.

**En caso de Inhalación,** retire al paciente a un lugar fresco y aplique respiración artificial si fuera necesario.

Después de la aplicación lavarse las manos y el resto del cuerpo con abundante agua y jabón.

**NOTA AL MÉDICO**

**ANTÍDOTO:** No existe antídoto específico. Proporcione tratamiento sintomático.

**TELÉFONO DE EMERGENCIAS**

**SAMU: 106**

**INTEROC S.A. (511) 614-5100**

**CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilícelo la funda o bolsa cortandola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**

Tóxico para abejas y artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración, ni en presencia de abejas o polinizadores en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.

Notificar a los apicultores antes de aplicar el producto, para el confinamiento de sus abejas.

Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes. Evitar la deriva.

Peligroso para peces y demás organismos acuáticos, plantas acuáticas y semi-acuáticas.

No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de la aplicación, sobranes del producto o envases vacíos.

No aplicar en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.

Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos 10 metros.

Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.

En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**STRICTO®** pertenece al grupo de los neonicotinoideos, con acción sistémica y actúa por contacto e ingestión sobre los insectos, afectando su sistema nervioso, específicamente sus receptores nicotínicos, los que les causa la parálisis y luego la muerte.

**STRICTO®** se aplica en aspersión con equipos de aspersión terrestre, previa mezcla con agua.

Preparar una premezcla de acuerdo a la dosis indicada con la mitad de volumen del agua a utilizar, agitar hasta que el producto este bien disuelto y completar el volumen de la aplicación.

Calibrar el equipo previamente.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

Aplicar previa evaluación.

Realizar como máximo 2 aplicaciones por campaña/año. Considerando 2 campañas al año. La segunda aplicación con un intervalo de aplicación de 30 días en tomate y 15 días en espárrago.

La dosis máxima es de 0.2 Kg/ha.

En caso se requiera una nueva aplicación, usar otro insecticida de diferente mecanismo de acción, a fin de evitar la resistencia.

Para el cultivo de arroz y pimiento máximo 2 aplicaciones por campaña/año y para los cultivos de palto y vid una aplicación por campaña/año.

**PERÍODO DE REINGRESO**

Se recomienda no ingresar al área tratada, sin equipo de protección, hasta 24 horas después de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD**

Es compatible con la mayoría de productos fitosanitarios.

**FITOTOXICIDAD**

El producto no presenta efectos fitotóxicos a la dosis recomendada.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El Titular del Registro garantiza que las características físico - químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto".

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	N. COMÚN	N. CIENTÍFICO	kg/200L	kg/ha		
Tomate <i>Lycopersicon esculentum</i>	Mosca blanca	<i>Bemisia tabaci</i>	0.1	-	1	1
	Caracha (Mosquilla de los brotes)	<i>Prodiplosis longifila</i>	0.20	-	1	
Espárrago <i>Asparagus officinalis</i>	Caracha (Mosquilla de los brotes)	<i>Prodiplosis longifila</i>	0.20	-	7	0.5
Arroz <i>Oryza sativa</i>	Mosquilla del arroz	<i>Hydrellia wirthi</i>	0.10	-	7	8.0
Pimiento <i>Capsicum annuum</i>	Caracha (Mosquilla de los brotes)	<i>Prodiplosis longifila</i>	0.20	-	21	0.5
Palto <i>Persea americana</i>	Escama Latania	<i>Hemiberlesia lataniae</i>	-	0.8 - 1.2	120	0.01
Vid <i>Vitis vinifera</i>	Cochinilla harinosa	<i>Planococcus citri</i> - <i>Planococcus ficus</i>	0.07-0.09	-	28	0.01

**Uso en Invernadero o casa malla**

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	N. COMÚN	N. CIENTÍFICO	kg/200L	kg/ha		
Pimiento <i>Capsicum annuum</i>	Caracha (Mosquilla de los brotes)	<i>Prodiplosis longifila</i>	0.20	-	21	0.5

PC: Período de Carencia

LMR: Límite Máximo de Residuos ppm: Partes por millón



“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

# Stricto®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)

**COMPOSICIÓN:**

DINOTEFURAN.....500 g/kg  
Aditivos.....c.s.p. 1 kg

Reg. PQUA N° 1127 – SENASA

 **INTEROC**

*Pasión por la innovación*

**Titular de Registro,  
Importador y Distribuidor:  
INTEROC S.A.**

Av. Javier Prado Oeste 2442  
Piso 16. Magdalena Del Mar  
Lima - Perú  
Telf.: (51 1) 614-5100

**Formulador:**

**CAC NANTONG  
CHEMICAL CO., LTD.**

Fourth Huanghai Road,  
Yangkou Chemical  
Industrial Park, Nantong,  
Telf.: +86-513-68925288  
Jiangsu, China

**Contenido Neto: 1 kg**

**Fecha de Formulación:**

**N° de Lote:**

**Fecha de Vencimiento:**



**NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO**

**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

**LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

Este producto es dañino, no ingerir ni inhalar la aspersión.

Utilice el equipo de protección durante la mezcla, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas.

No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.

Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa y báñese con abundante agua y jabón.

Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado, en un lugar bajo techo, fresco, seco y ventilado.

No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas o forrajes.

No utilizar el envase vacío para almacenar bebidas ni alimentos.

**INSTRUCCION DE PRIMEROS AUXILIOS**

**Grupo Químico:** Neonicotinoide.

**En caso de intoxicación o ingestión,** lleve al paciente inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta.

**En caso de ingestión,** enjuagar la boca con agua si está consciente. No provoque el vómito.

**En contacto con los ojos,** lávelos inmediatamente con agua limpia durante 15 minutos.

**En contacto con la piel,** quitar la ropa y lavar la piel con abundante agua y jabón.

**En caso de Inhalación,** retire al paciente a un lugar fresco y aplique respiración artificial si fuera necesario.

Después de la aplicación lavarse las manos y el resto del cuerpo con abundante agua y jabón.

**NOTA AL MÉDICO**

**ANTÍDOTO:** No existe antídoto específico. Proporcione tratamiento sintomático.

**TELÉFONO DE EMERGENCIAS**

**SAMU: 106**

**INTEROC S.A. (511) 614-5100**

**CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilicelo la funda o bolsa cortandola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**

Tóxico para abejas y artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración, ni en presencia de abejas o polinizadores en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.

Notificar a los apicultores antes de aplicar el producto, para el confinamiento de sus abejas.

Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes. Evitar la deriva.

Peligroso para peces y demás organismos acuáticos, plantas acuáticas y semi-acuáticas.

No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.

No aplicar en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.

Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos 10 metros.

Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.

En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**STRICTO®** pertenece al grupo de los neonicotinoides, con acción sistémica y actúa por contacto e ingestión sobre los insectos, afectando su sistema nervioso, específicamente sus receptores nicotínicos, los que les causa la parálisis y luego la muerte.

**STRICTO®** se aplica en aspersión con equipos de aspersión terrestre, previa mezcla con agua.

Preparar una premezcla de acuerdo a la dosis indicada con la mitad de volumen del agua a utilizar, agitar hasta que el producto este bien disuelto y completar el volumen de la aplicación.

Calibrar el equipo previamente.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

Aplicar previa evaluación.

Realizar como máximo 2 aplicaciones por campaña/año. Considerando 2 campañas al año. La segunda aplicación con un intervalo de aplicación de 30 días en tomate y 15 días en espárrago. La dosis máxima es de 0.2 Kg/ha.

En caso se requiera una nueva aplicación, usar otro insecticida de diferente mecanismo de acción, a fin de evitar la resistencia.

Para el cultivo de arroz y pimiento maximo 2 aplicaciones por campaña/año y para los cultivos de palto y vid una aplicación por campaña/año.

**PERÍODO DE REINGRESO**

Se recomienda no ingresar al área tratada, sin equipo de protección, hasta 24 horas después de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD**

Es compatible con la mayoría de productos fitosanitarios.

**FITOTOXICIDAD**

El producto no presenta efectos fitotóxicos a la dosis recomendada.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

"El Titular del Registro garantiza que las características físico - químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto".

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	N. COMÚN	N. CIENTÍFICO	kg/200L	kg/ha		
Tomate <i>Lycopersicon esculentum</i>	Mosca blanca	<i>Bemisia tabaci</i>	0.1	-	1	1
	Caracha (Mosquilla de los brotes)	<i>Prodiplaxis longifilla</i>	0.20	-	1	
Espárrago <i>Asparagus officinalis</i>	Caracha (Mosquilla de los brotes)	<i>Prodiplaxis longifilla</i>	0.20	-	7	0.5
	Arroz <i>Oryza sativa</i>	Mosquilla del arroz	<i>Hydrellia wirthi</i>	0.10	-	7
Pimiento <i>Capsicum annuum</i>	Caracha (Mosquilla de los brotes)	<i>Prodiplaxis longifilla</i>	0.20	-	21	0.5
Palto <i>Persea americana</i>	Escama Latania	<i>Hemiberlesia lataniae</i>	-	0.8 - 1.2	120	0.01
Vid <i>Vitis vinifera</i>	Cochinilla harinosa	<i>Planococcus citri - Planococcus ficus</i>	0.07-0.09	-	28	0.01

**Uso en Invernadero o casa malla**

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	N. COMÚN	N. CIENTÍFICO	kg/200L	kg/ha		
Pimiento <i>Capsicum annuum</i>	Caracha (Mosquilla de los brotes)	<i>Prodiplaxis longifilla</i>	0.20	-	21	0.5

PC: Período de Carencia

LMR: Límite Máximo de Residuos ppm: Partes por millón



“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

# Stricto®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)

**COMPOSICIÓN:**

DINOTEFURAN.....500 g/kg  
Aditivos.....c.s.p. 1 kg

Reg. PQUA N° 1127 – SENASA

 **INTEROC**

*Pasión por la innovación*

**Titular de Registro,  
Importador y Distribuidor:**  
**INTEROC S.A.**  
Av. Javier Prado Oeste 2442  
Piso 16. Magdalena Del Mar  
Lima - Perú  
Telf.: (51 1) 614-5100

**Formulador:**  
**HEBEI VEYONG  
CHEMICAL CO., LTD.**  
393 East Heping Road,  
Shijiazhuang City  
Hebei - China  
Tel.+86-311-85915963

**Contenido Neto: 1 kg**  
**Fecha de Formulación:**  
**N° de Lote:**  
**Fecha de Vencimiento:**

**NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO**

**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

Este producto es dañino, no ingerir ni inhalar la aspersión.  
Utilice el equipo de protección durante la mezcla, aplicación y para ingresar a la área tratada en las primeras 12 horas.

No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.

Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa y báñese con abundante agua y jabón.

Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado, en un lugar bajo techo, fresco, seco y ventilado.

No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas o forrajes.

No utilizar el envase vacío para almacenar bebidas ni alimentos.

**INSTRUCCION DE PRIMEROS AUXILIOS**

**Grupo Químico:** Neonicotinoide.

**En caso de intoxicación o ingestión,** lleve al paciente inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta.

**En caso de ingestión,** enjuagar la boca con agua si está consciente. No provoque el vómito.

**En contacto con los ojos,** lávelos inmediatamente con agua limpia durante 15 minutos.

**En contacto con la piel,** quitar la ropa y lavar la piel con abundante agua y jabón.

**En caso de Inhalación,** retire al paciente a un lugar fresco y aplique respiración artificial si fuera necesario.

Después de la aplicación lavarse las manos y el resto del cuerpo con abundante agua y jabón.

**NOTA AL MÉDICO**

**ANTÍDOTO:** No existe antídoto específico. Proporcione tratamiento sintomático.

**TELÉFONO DE EMERGENCIAS**

**SAMU: 106**

**INTEROC S.A. (511) 614-5100**

**CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilicelo la funda o bolsa cortandola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**

Tóxico para abejas y artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración, ni en presencia de abejas o polinizadores en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.

Notificar a los apicultores antes de aplicar el producto, para el confinamiento de sus abejas.

Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes. Evitar la deriva.

Peligroso para peces y demás organismos acuáticos, plantas acuáticas y semi-acuáticas.

No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de la aplicación, sobantes del producto o envases vacíos.

No aplicar en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.

Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos 10 metros.

Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.

En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**STRICTO®** pertenece al grupo de los neonicotinoides, con acción sistémica y actúa por contacto e ingestión sobre los insectos, afectando su sistema nervioso, específicamente sus receptores nicotínicos, los que les causa la parálisis y luego la muerte.

**STRICTO®** se aplica en aspersión con equipos de aspersión terrestre, previa mezcla con agua. Preparar una premezcla de acuerdo a la dosis indicada con la mitad de volumen del agua a utilizar, agitar hasta que el producto este bien disuelto y completar el volumen de la aplicación. Calibrar el equipo previamente.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

Aplicar previa evaluación.

Realizar como máximo 2 aplicaciones por campaña/año. Considerando 2 campañas al año. La segunda aplicación con un intervalo de aplicación de 30 días en tomate y 15 días en espárrago. La dosis máxima es de 0.2 Kg/ha.

En caso se requiera una nueva aplicación, usar otro insecticida de diferente mecanismo de acción, a fin de evitar la resistencia.

Para el cultivo de arroz y pimiento maximo 2 aplicaciones por campaña/año y para los cultivos de palto y vid una aplicación por campaña/año.

**PERÍODO DE REINGRESO**

Se recomienda no ingresar al área tratada, sin equipo de protección, hasta 24 horas después de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD**

Es compatible con la mayoría de productos fitosanitarios.

**FITOTOXICIDAD**

El producto no presenta efectos fitotóxicos a la dosis recomendada.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El Titular del Registro garantiza que las características físico - químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto".

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	N. COMÚN	N. CIENTÍFICO	kg/200L	kg/ha		
Tomate <i>Lycopersicon esculentum</i>	Mosca blanca	<i>Bemisia tabaci</i>	0.1	-	1	1
	Caracha (Mosquilla de los brotes)	<i>Prodioplosis longifila</i>	0.20	-	1	
Espárrago <i>Asparagus officinalis</i>	Caracha (Mosquilla de los brotes)	<i>Prodioplosis longifila</i>	0.20	-	7	0.5
	Arroz <i>Oryza sativa</i>	Mosquilla del arroz	<i>Hydrellia wirthi</i>	0.10	-	7
Pimiento <i>Capsicum annuum</i>	Caracha (Mosquilla de los brotes)	<i>Prodioplosis longifila</i>	0.20	-	21	0.5
Palto <i>Persea americana</i>	Escama Latania	<i>Hemiberlesia lataniae</i>	-	0.8 - 1.2	120	0.01
Vid <i>Vitis vinifera</i>	Cochinilla harinosa	<i>Planococcus citri</i> - <i>Planococcus ficus</i>	0.07-0.09	-	28	0.01

**Uso en Invernadero o casa malla**

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	N. COMÚN	N. CIENTÍFICO	kg/200L	kg/ha		
Pimiento <i>Capsicum annuum</i>	Caracha (Mosquilla de los brotes)	<i>Prodioplosis longifila</i>	0.20	-	21	0.5

**PC:** Periodo de Carenacia

**LMR:** Limite Máximo de Residuos **ppm:** Partes por millón

