

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

# LOZZARE®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)

Composición:

Boscalid ..... 500 g/kg  
Aditivos ..... c.s.p.1kg

Reg. PQUA N° - SENASA

Titular de Registro:  
UPL PERU S.A.C.  
Jr. Caracas Nro. 2226 Urb.Oyague, Jesús María - Lima  
Teléfono: (01) 6110831



Formulador:  
UPL LIMITED  
11th Road, Madhu Park, Khar (West), Mumbai - 400052,  
India.  
Telf.: +91 9752097657

Fecha de Formulación:  
N° de Lote:  
Contenido Neto: 100 g  
Fecha de vencimiento:

Nocivo en caso de ingestión  
Nocivo en contacto con la piel  
Nocivo si se inhala

Tóxico para organismos acuáticos



ATENCIÓN

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”  
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Durante la manipulación y aplicación, y para ingresar al área tratada de acuerdo al periodo de reentrada (12 horas), use camisa de manga larga, pantalón largo, botas, visor, tapabocas o mascarara y guantes.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada por separada y báñese con abundante agua y jabón.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Mantener el producto en el envase original, etiquetado y cerrado, alejado de alimentos y medicinas para uso humano y veterinario, bajo condiciones que garanticen su conservación.
- El uso inadecuado de este producto causa daños a la salud y al ambiente.
- No almacenar en casa de habitación.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo químico: Carboxamida.
- Si se necesita asesoramiento médico, tener a la mano el envase o la etiqueta del producto.
- Cambiarse inmediatamente la ropa contaminada y desecharla de manera segura. En caso de inhalación: Mover al aire fresco. Mantener al paciente caliente y en reposo.
- Llamar al centro de control de intoxicaciones de inmediato.
- En caso de contacto con la piel: Lavar bien con abundante agua y jabón y enjuagar con agua. Si los síntomas persisten, llamar a un médico. En caso de contacto con los ojos: Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también debajo de los párpados durante al menos 15 minutos. Si los tiene, retirar los lentes de contacto después de los primeros 5 minutos, luego continuar enjuagando los ojos. Si la irritación persiste, buscar atención médica.
- En caso de ingestión: Enjuagar la boca. No inducir al vómito. Llamar a un médico o al centro de control de intoxicaciones.
- Indicaciones para el médico: Tratamiento sintomático y de soporte. No tiene un antídoto específico.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA**  
SAMU: 106  
UPL PERU S.A.C.: (01) 6110831  
CISPROQUIM: 0800-50847

**CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la bolsa cortándola. Entréguela o depositela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**

- Tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos diez (10) metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

- **LOZZARE** es un fungicida sistémico y traslaminar a base de boscalid, actúa sobre la respiración mitocondrial inhibiendo la germinación de esporas así como el crecimiento micelial y esporulación del hongo en la superficie de las hojas. **LOZZARE** tiene actividad preventiva y curativa.
- **LOZZARE** se debe preparar diluyendo la dosis indicada en un recipiente previo con agua, luego esta solución se lleva al cilindro o mochila según el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, manteniendo siempre agitación constante y se procede a aplicar.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

| Cultivo  | Plaga                |                                 | Dosis (kg/ha) | P.C. (días) | L.M.R. (ppm) |
|----------|----------------------|---------------------------------|---------------|-------------|--------------|
|          | Nombre común         | Nombre científico               |               |             |              |
| Arándano | Cabeza de clavo      | <i>Alternaria tenuissima</i>    | 0.8 - 1.0     | 1           | 15           |
|          | Podredumbre gris     | <i>Botrytis cinerea</i>         | 1.0 - 1.2     | 1           |              |
|          | Oidiois del arándano | <i>Microsphaera penicillata</i> | 0.25 - 0.30   | 1           |              |
| Cebolla  | Alternariosis        | <i>Alternaria porri</i>         | 0.22          | 1           | 5            |
| Fresa    | Podredumbre gris     | <i>Botrytis cinerea</i>         | 0.6 - 0.8     | 1           | 3            |
| Papa     | Tizón temprano       | <i>Alternaria solani</i>        | 0.2           | 30          | 2            |
| Vid      | Podredumbre gris     | <i>Botrytis cinerea</i>         | 1.0 - 1.2     | 7           | 5            |
|          | Oidiois              | <i>Erysiphe necator</i>         | 0.4 - 0.5     | 7           |              |

\*Gasto de agua: arándano = 600 L/ha; cebolla, fresa,papa = 400 L/ha; vid = 100 L/ha

P.C: Periodo de carencia L.M.R: Límite máximo de residuos

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**  
Aplicar cuando se presenten los primeros síntomas de la enfermedad o antes de observar su presencia, cuando las condiciones medioambientales sean favorables para su desarrollo. Se recomienda una aplicación por campaña, considerando una campaña por año.

**PERIODO DE REINGRESO**  
No ingresar a las áreas tratadas, sin ropa protectora, hasta 12 horas después de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD**  
**LOZZARE** es compatible con los plaguicidas de uso común, aún así al realizar la mezcla, es recomendable efectuar una confirmación previa de compatibilidad.

**FITOTOXICIDAD**  
La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**  
El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información, comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

CATEGORÍA TOXICOLOGICA 4  
LIGERAMENTE PELIGROSO

