


LOZZARE®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA**FUNGICIDA AGRÍCOLA****GRUPO QUÍMICO:** Carboxamida**FORMULACIÓN:** Gránulos dispersables (WG)**N° DE REGISTRO:** PQUA N° - SENASA**NOMBRE COMÚN:** Boscalid**NOMBRE QUÍMICO:**

2-chloro-N-(4'-chlorobiphenyl-2-yl)nicotinamide

FÓRMULA ESTRUCTURAL:**FÓRMULA EMPÍRICA:** $C_{18}H_{12}Cl_2N_2O$ **PESO MOLECULAR:**

343.21 g.

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS DEL FORMULADO:

Estado físico: Sólido

Color: Beige a marrón claro

Olor: Característico

Densidad: 636.1 g/L

pH: 4.0 – 7.0

Explosividad: No explosivo

COMPOSICIÓN:

Boscalid 500 g/kg

ENVASES:

Tipo: Bolsas

Capacidad: 100 g y 1 kg

Titular de Registro:

UPL PERU S.A.C.

Jr. Caracas Nro. 2226 Urb. Oyague, Jesús María, Lima

Teléfono: (01) 6110831

Formulador:

UPL LIMITED

11th Road, Madhu Park, Khar (West), Mumbai - 400052

India

Teléfono: +91 9752097657

Nocivo en caso de ingestión

Nocivo en contacto con la piel

Nocivo si se inhala

Tóxico para organismos
acuáticos**ATENCIÓN**

"LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Durante la manipulación y aplicación, y para ingresar al área tratada de acuerdo al periodo de reentrada (12 horas), use camisa de manga larga, pantalón largo, botas, visor, tapabocas o máscara y guantes.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada por separada y báñese con abundante agua y jabón.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Mantener el producto en el envase original, etiquetado y cerrado, alejado de alimentos y medicinas para uso humano y veterinario, bajo condiciones que garanticen su conservación.
- El uso inadecuado de este producto causa daños a la salud y al ambiente.
- No almacenar en casa de habitación.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS Y ROPA DE APLICACIÓN

Para realizar la mezcla: Protección total, use guantes, careta de protección, mascarilla, overol de dos piezas sobre la ropa de trabajo y utilice peto o delantal.
Para realizar la aplicación: Protección total, use guantes, careta de protección, mascarilla, overol de dos piezas sobre la ropa de trabajo y utilice peto o delantal.

INTRUCCIONES PARA EL BUEN ALMACENAMIENTO

Almacene en lugares que tengan baja humedad, a temperatura normal y con buena ventilación.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Carboxamida
- Si se necesita asesoramiento médico, tener a la mano el envase o la etiqueta del producto.
- Cambiarse inmediatamente la ropa contaminada y desecharla de manera segura. En caso de inhalación: Mover al aire fresco. Mantener al paciente caliente y en reposo.
- Llamar al centro de control de intoxicaciones de inmediato.
- En caso de contacto con la piel: Lavar bien con abundante agua y jabón y enjuagar con agua. Si los síntomas persisten, llamar a un médico. En caso de contacto con los ojos: Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también debajo de los párpados durante al menos 15 minutos. Si los tiene, retirar los lentes de contacto después de los primeros 5 minutos, luego continuar enjuagando los ojos. Si la irritación persiste, buscar atención médica.
- En caso de ingestión: Enjuagar la boca. No inducir al vómito. Llamar a un médico o al centro de control de intoxicaciones.
- Indicaciones para el médico: Tratamiento sintomático y de soporte. No tiene un antídoto específico.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

SAMU: 106
UPL PERU S.A.C.: (01) 6110831
CISPROQUIM: 0800-50847

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la bolsa cortándola. Entréguela o deposítela el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos diez (10) metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4: LIGERAMENTE PELIGROSO**INSTRUCCIONES PARA LAVAR EL EQUIPO DE APLICACIÓN**

Después del uso diario, enjuague el tanque de pulverizador, la bomba, la mochila y mangueras con agua limpia. Limpie el filtro y boquillas. Vacíe el tanque y deje que se seque. Use un cepillo u otro material suave para limpiar la punta de la boquilla. Nunca utilice un pedazo de alambre, una puntilla u otro objeto de metal ya que estos dañarán el orificio y distorsionarán el patrón de aplicación e incrementarán el caudal de salida de la boquilla.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

LOZZARE es un fungicida sistémico y traslaminar a base de boscalid; actúa sobre la respiración mitocondrial inhibiendo la germinación de esporas, así como el crecimiento micelial y esporulación del hongo en la superficie de las hojas. **LOZZARE** tiene actividad preventiva y curativa.

LOZZARE se debe preparar diluyendo la dosis indicada en un recipiente previo con agua, luego esta solución se lleva al cilindro o mochila según el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, manteniendo siempre agitación constante y se procede a aplicar.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cultivo	Plaga		Dosis (kg/ha)	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Arándano	Cabeza de clavo	<i>Alternaria tenuissima</i>	0.8 - 1.0	1	15
	Podredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	1.0 - 1.2	1	
	Oidiosis del arándano	<i>Microsphaera penicillata</i>	0.25 - 0.30	1	
Cebolla	Alternariosis	<i>Alternaria porri</i>	0.22	1	5
Fresa	Podredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.6 - 0.8	1	3
Papa	Tizón temprano	<i>Alternaria solani</i>	0.2	30	2
Vid	Podredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	1.0 - 1.2	7	5
	Oidiosis	<i>Erysiphe necator</i>	0.4 - 0.5	7	

*Gasto de agua: arándano = 600 L/ha; cebolla, fresa, papa = 400 L/ha; vid = 100 L/ha
P.C: Periodo de carencia L.M.R: Límite máximo de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar cuando se presenten los primeros síntomas de la enfermedad o antes de observar su presencia, cuando las condiciones medioambientales sean favorables para su desarrollo. Se recomienda una aplicación por campaña, considerando una campaña por año.

PERIODO DE REINGRESO

No ingrese a las áreas tratadas, sin ropa protectora, hasta 12 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

LOZZARE es compatible con los plaguicidas de uso común, aún así al realizar la mezcla, es recomendable efectuar una confirmación previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

