

# Sasori 240 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**INSECTICIDA AGRÍCOLA**

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

## COMPOSICIÓN

Spirotetramat ..... 240 g/L  
Aditivos ..... c.s.p. 1L

Reg. PQUA N° - SENASA

BIOTECH CORP S.A.C.  
Av. Juan de Aliaga 425 Piso 10,  
Oficina 1007- Magdalena del Mar - Lima, Perú



Formulador:  
NANJING ESSENCE FINE - CHEMICAL CO. LTD  
4th Floor, Building 5, No. 150 Pubin Road, Nanjing - CHINA

Fecha de Formulación:  
N° de Lote:

Contenido neto: **500 ml**

Fecha de vencimiento:

NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN  
NOCIVO EN CONTACTO CON LA PIEL  
NOCIVO SI SE INHALA

TÓXICO PARA ORGANISMOS  
ACUÁTICOS



## ATENCIÓN

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

“Utilice ropa protectora durante la manipulación, mezcla, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas”  
“En caso de intoxicación llame al médico más cercano y muéstrele esta etiqueta y hoja informativa adjunta”



TELÉFONO DE EMERGENCIAS

SAMU: 106 - BIOTECH CORP S.A.C. 942 963 027

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

| CULTIVO | PLAGA                 |                          | DOSIS  |           | P.C.<br>(días) | LMR<br>(ppm) |
|---------|-----------------------|--------------------------|--------|-----------|----------------|--------------|
|         | NOMBRE COMÚN          | NOMBRE CIENTÍFICO        | L/200L | L/Ha*     |                |              |
| Vid     | “Cochinilla harinosa” | <i>Planococcus ficus</i> | 0.10   | 0.5 - 0.6 | 7              | 1.3          |

\*Gasto de agua 1000 – 1200 L/Ha

LMR: Limite Máximo de Residuos (ppm: partes por millón)

P.C.: Periodo de Carencia (días)

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4 - LIGERAMENTE PELIGROSO

