

150.00 mm

220.06 mm

**““LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO””
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Evite el contacto con la piel, ojos y vías respiratorias.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar juntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Durante el transporte y manipulación, proteger de la luz solar y alta temperatura.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimento o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- No existe antídoto específico. El tratamiento es sintomático.
- En caso de intoxicación llamar al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral si la persona esta inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de con la piel, retirar la ropa y el cazado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminadas y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial, si fuese necesario. Llamar inmediatamente a un médico.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
SAMU: 106
FUNGICOL DEL PEREU SAC: (01) 989 973 074

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicida debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Aplicar temprano por la mañana o por la tarde. Evitar la deriva por el viento.
- No arrojar los sobrantes del producto, ni lavar los equipos de aplicación en acequias, riachuelos, lagos, ríos, arroyos o canales de regadío.
- No arrojar envases vacíos a lagos, ríos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua, disponer los desechos según las normas de su empresa.
- Respetar una banda de no aplicación hacia los cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- No aplicar en zonas con napas freáticas superficiales o con suelos altamente permeables.
- No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- Aplicar el producto como se indica en la etiqueta.
- En caso de derrame recoger inmediatamente el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

LILACIL es un nematocida agrícola cuyo ingrediente activo es *Purpureocillium lilacinum*. Este hongo se adhiere a la cutícula de los nemátodos para posteriormente ingresar al interior a través de las partes blandas o por vía oral. Una vez dentro del hospedero, las esporas germinan y el micelio produce toxinas que le producen la muerte al huésped en cuestión de 3 a 4 días. Los organismos afectados pierden sensibilidad muestran movimientos descoordinados y parálisis.

Método de preparación y aplicación

LILACIL debe ser premezclado con agua en recipiente menor para finalmente verter la solución en tanque agitando de forma permanentes para mantener la uniformidad. LILACIL se aplica en chorro dirigido al suelo.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

Cultivo	PLAGA		DOSIS Kg/Ha	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Vid	“Nemátodo”	<i>Meloidogyne incognita</i>	1	N.A.	N.A.

L.M.R. = Límite Máximo de Residuos PC = Periodo de carencia

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

El momento para realizar la aplicación es al observar los primeros síntomas de la presencia de *Meloidogyne incognita* en vid, evaluando la presencia de huevos y juveniles en las raíces. Las aplicaciones deberán realizarse cuando las plantas de vid se encuentren en desarrollo vegetativo. Se recomienda 2 aplicaciones/campaña, 1 campaña al año.

PERIODO DE REINGRESO:

No ingresar al área tratada hasta después de 24 horas de realizada la aplicación del producto.

COMPATIBILIDAD:

LILACIL es compatible con fungicidas y otros insumos agrícolas. Se recomienda hacer pruebas de compatibilidad previas a su mezcla. Tener especial precaución en mezclas con productos que contengan cobre.

FITOTOXICIDAD:

No se observaron síntomas de fitotoxicidad luego de ser aplicado a las dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular del Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere más información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

