

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA
ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL
ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Durante la manipulación y aplicación, y para ingresar al área tratada de acuerdo al periodo de reentrada (12 horas) use camisa de manga larga, pantalón largo, botas, visor, tapabocas o máscara y guantes. En caso de intoxicación accidental llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrelle la etiqueta y hoja informativa adjunta.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

SAMU: 106 / PILARBIO PERU SAC: (01)655 0839 /
(+51)989 597 697



Titular de Registro:

PILARBIO PERÚ S.A.C.

Formulador:

PILARQUIM (JIANGSU) Co., Ltd

PILARFEND

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN DE ENCAPSULADO
Y SUSPENSIÓN CONCENTRADA (ZC)

Composición:

Lambdacyhalothrin 50 g/L

Chlorantraniliprole 100 g/L

Aditivos: c.s.p. 1 L

REGISTRO PQUA Nº XXX - SENASA



Contenido Neto: 250ml

Importador y Distribuidor:

PILARBIO PERU S.A.C.

NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN
NOCIVO EN CONTACTO CON LA PIEL
NOCIVO SI SE INHALA

MUY TÓXICO PARA
ORGANISMOS ACUÁTICOS



PELIGRO

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS (L/ha)*	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
ESPÁRRAGO	Gusano Cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.3	3	0.02 ⁽¹⁾ 0.01 ⁽²⁾
MAÍZ	Gusano Cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.12 - 0.20	21	0.02 ⁽¹⁾ 0.01 ⁽²⁾

* Gasto de agua: Espárrago=620-680 L/ha, maíz=260-310 L/ha

PC: Período de Carencia (días). LMR: Límite Máximo de Residuos en ppm.

(1) Lambdacyhalotrina - (2) Chlorantraniliprole

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4 - LIGERAMENTE PELIGROSO

Nº de Lote:

Fecha de Form.:

Fecha de Venc.:



PRIMER PDF

V01 | Ref. Etiqueta 250 ml

Producto: Pilarfend

País: Perú

Fecha: Feb 20, 2025

Tamaño: 185 x 65 mm

TINTAS (5)

Cian

Amarillo

Pantone

293 C

Negro

Magenta

CONTROL DE CAMBIOS