

ET SAGOL 500 mL

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA  
ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”  
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS  
NIÑOS”

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Cuidado este producto causa irritación dérmica, evite el contacto con la piel y los ojos.
- Causa ligera irritación a los ojos, usar gafas protectoras.
- El contacto prolongado y repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- Usar el equipo de protección en la preparación y aplicación y para ingresar al campo dentro de las 24 horas de aplicado el producto.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**

- En caso de ingestión, no inducir al vómito. Nunca le dé nada por la boca a una persona inconsciente.
- Antídoto: Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**

SAMU: 106 / SINERIA PERU S.A.C.: 945138049

**CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.



**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**

- Tóxico para peces y organismos acuáticos.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

# SAGOL

EXTRACTO VEGETAL

INSECTICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

**Composición:**

Extracto de *Larrea tridentata* ..... 250 g/L  
Aditivos ..... c.s.p. 1L

Reg. N° -SENASA-PBA-EV

Titular de Registro:  
SINERIA PERU S.A.C.

Formulador:  
GreenCorp Biorganik de México S.A. de CV

N° de Lote:  
Fecha de Formulación:  
Fecha de Vencimiento:

Contenido Neto:  
500 mL

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

Agregar en el tanque de aplicación la mitad del agua a emplear, luego agregar la dosis recomendada y remover. Finalmente completar con agua la capacidad total del tanque, remover y aplicar.

**“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”**

Cultivo	Plaga		Dosis L/Ha	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Banano	Trips del plátano	<i>Chaetanaphothrips signipennis</i>	2.0	N.A.	N.A.
Cebolla	Trips	<i>Thrips tabaci</i>	1 - 1.5	N.A.	N.A.

LMR: Límite máximo de residuo

PC: Periodo de Carenza

NA.: No aplica

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

Aplicar cuando se observen los primeros ataques de la plaga. Para los cultivos de banano y cebolla, realizar 2 aplicaciones por campaña al año considerando un intervalo de 7 días entre aplicación. En banano usar la mayor dosis cuando la presión de la plaga sea mayor.

**PERIODO DE REINGRESO**

Reingresar al área tratada 24 horas después de la aplicación del producto.

**FITOTOXICIDAD**

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.

LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO



“LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”  
 “MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Cuidado este producto causa irritación dermal, evite el contacto con la piel y los ojos.
- Causa ligera irritación a los ojos, usar gafas protectoras.
- El contacto prolongado y repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- Usar el equipo protección en la preparación y aplicación y para ingresar al campo dentro de las 24 horas de aplicado el producto.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Después de usar el producto cambiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**

- En caso de ingestión, no inducir al vómito. Nunca le dé nada por la boca a una persona inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 a 20 minutos.
- En caso de contacto de la piel, quítese la ropa contaminada. Lave bien la piel y el cabello, haga dos lavados con agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona al aire fresco, si no respira, dé respiración artificial. Busque atención médica si se desarrollan problemas respiratorios.
- Antídoto: Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**  
 SAMU: 106  
 SINERIA PERU S.A.C.: 945138049

# SAGOL

**EXTRACTO VEGETAL**

**INSECTICIDA AGRÍCOLA**

**CONCENTRADO SOLUBLE (SL)**

**Composición:**

Extracto de *Larrea tridentata* ..... 250 g/L  
 Aditivos ..... c.s.p. 1L

Reg. N° -SENASA-PBA-EV

**Propiedades de la formulación:**

Estado físico: **Líquido**  
 Color: **Marrón a Granate**  
 Olor: **Aromático**  
 Densidad: **0.00103 g/L**  
 pH: **5.5**

Estabilidad en el almacenamiento: El producto es estable bajo condiciones normales de almacenamiento. Para almacenarlo, se debe mantener en su envase original, en un lugar seguro, seco y fresco.

**Titular de Registro:**

**SINERIA PERU S.A.C.**  
 Av. Caminos del Inca Nro. 131 Int. G204 Urb. Chacarilla del Estanque, Santiago de Surco, Lima, Perú.  
 Teléfono: 945138049

**Formulador:**

**SINERIA CHINA LTD.**  
 Huaicheng, Zhengfang Park, Kangma Road, Huaian district, Huaian city, China.  
 Teléfono: +862557671776

**NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO**



**LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO**

**CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva al envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**

- Tóxico para peces y organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos diez (10) metros.
- No aplicar en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- No permita animales en la zona tratada.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

SAGOL es un formulado extraído de la planta Gobernadora (*Larrea tridentata*) con acción repelente frente a los insectos del cuadro de uso.

Agregar en el tanque de aplicación la mitad del agua a emplear, luego agregar la dosis recomendada y remover. Finalmente completar con agua la capacidad total del tanque, remover y aplicar.

**“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”**

Cultivo	Plaga		Dosis L/Ha	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Banano	Trips del plátano	<i>Chaetanaphothrips signipennis</i>	2.0	N.A.	N.A.
Cebolla	Trips	<i>Thrips tabaci</i>	1 - 1.5	N.A.	N.A.

PC: Periodo de carencia  
 NA: No aplica

LMR: Limite máximo de residuo

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

Aplicar cuando se observen los primeros ataques de la plaga. Para los cultivos de banano y cebolla, realizar 2 aplicaciones por campaña al año considerando un intervalo de 7 días entre aplicación. En banano usar la mayor dosis cuando la presión de la plaga sea mayor.

**PERIODO DE REINGRESO**

Reingresar al área tratada 24 horas después de la aplicación del producto.

**COMPATIBILIDAD**

SAGOL es compatible con sustancias alcalinas y oxidantes pero es incompatible con sustancias reductora. Antes de hacer una mezcla, se recomienda realizar pruebas de compatibilidad.

**FITOTOXICIDAD**

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

**LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO**



ET SAGOL 500 mL

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA  
ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”  
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS  
NIÑOS”

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Cuidado este producto causa irritación dermal, evite el contacto con la piel y los ojos.
- Causa ligera irritación a los ojos, usar gafas protectoras.
- El contacto prolongado y repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- Usar el equipo protección en la preparación y aplicación y para ingresar al campo dentro de las 24 horas de aplicado el producto.

#### INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de ingestión, no inducir al vómito. Nunca le dé nada por la boca a una persona inconsciente.
- Antídoto: Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

#### TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

SAMU: 106 / SINERIA PERU S.A.C.: 945138049

#### CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.



#### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Tóxico para peces y organismos acuáticos.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

# SAGOL

## EXTRACTO VEGETAL

### INSECTICIDA AGRÍCOLA

## CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

#### Composición:

Extracto de *Larrea tridentata* ..... 250 g/L  
Aditivos ..... c.s.p. 1L

Reg. N° -SENASA-PBA-EV

Titular de Registro:  
SINERIA PERU S.A.C.

Formulador:  
SINERIA CHINA LTD.

N° de Lote:  
Fecha de Formulación:  
Fecha de Vencimiento:

Contenido Neto:  
500 mL

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

#### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Agregar en el tanque de aplicación la mitad del agua a emplear, luego agregar la dosis recomendada y remover. Finalmente completar con agua la capacidad total del tanque, remover y aplicar.

#### “CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

Cultivo	Plaga		Dosis L/Ha	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Banano	Trips del plátano	<i>Chaetanaphothrips signipennis</i>	2.0	N.A.	N.A.
Cebolla	Trips	<i>Thrips tabaci</i>	1 - 1.5	N.A.	N.A.

LMR: Límite máximo de residuo

PC: Periodo de Carenia

NA.: No aplica

#### FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar cuando se observen los primeros ataques de la plaga. Para los cultivos de banano y cebolla, realizar 2 aplicaciones por campaña al año considerando un intervalo de 7 días entre aplicación. En banano usar la mayor dosis cuando la presión de la plaga sea mayor.

#### PERIODO DE REINGRESO

Reingresar al área tratada 24 horas después de la aplicación del producto.

#### FITOTOXICIDAD

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

#### RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.



### LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO

